

Chirurgie Périmane

Operation

De la tumeur
d'extirpation du Solype
hyovertebrotomie
Lettre au sujet de l'hyovertebrotomie
Par M. Barre L.^e a. v. a. Moudun

Imprime

Javard eneorne
Leine

Demolure

Craxaud


Extirpation du corps pyramidal
amputation de la Lucine

n.º 46.

ARC38 mº91



ament aux



Chirurgie
Général

Extirpation du polype.

Les caustiques, ~~le~~ les relachans, la Feu etc, le fer etc. sont les moyens que l'art emploie pour détruire le polype.

Le volume, la consistance, la mollesse et la laxité des parties malades déterminent pour le choix.

Le polype est-il naissant, peu élevé, peu évasé ? les caustiques le morigereront et rappelleront les vaisseaux distendus et prolongés qui lui ont donné naissance à leur degré naturel de consistance et de densité.

Est-il plus saillant, la base est-elle large et fort épanouie, les vaisseaux sont-ils variqueux, mous et baveux ? les caustiques ou le cautère actuel seront employés avec succès.

Est-il enflammé et les parties sur lesquelles il siège sont-elles douloureuses et d'un sentiment exquis, saignées, delayées, tempérées, exposées la partie à la vapeur des decoctions de plantes relâchantes que vous aurez légèrement appliquées.



Est il logé dans la bouche fermé vous
de ces mêmes directions l'engorgement,
si en fin il est très volumineux, s'il comprime
quelque sorte la cavité dans laquelle
il se montre et s'il l'oppose réellement
à l'exécution des fonctions propres à
l'organe qu'il offense recourrez à
l'extirpation.

cette opération exige que
l'animal ait été depuis quelque temps
à la diète et soumis à un régime
légèrement astringent. il faut encore
qu'il soit à jeun et assujéti dans le
travail. fixés à l'égard des grands
quadrupèdes la tête d'une manière
inébranlable et de façon que les
poches nasales ou le fond de la
gorge soient à la portée des mains
et des yeux de l'artiste. Bouchés
aussi la vue du malade et
placés à la levre inférieure et
non aux oreilles le lien que
l'on appelle Torçéné, a l'effet de
prévenir tous les mouvements
aux quels il pourroit se livrer
dans le temps de l'introduction
des instruments.

Les animaux d'une plus petite
espèce peuvent être tenus de-
bout par des aides qui su-
assujétiront le corps d'unepart
en la tenant entre les jambes -
et en se mettant à cheval sur-
eux et de l'autre en leur
saisissant la tête et la croupe.

Des Crêtes ou cor plus petites -
seront mises sur une table
et assujéties ainsi que nous venons
de le prescrire, mais ne les renversés
ni ne les couchés proim, toute autre
situation que celle qui consiste à
être sur leurs quatre jambes pourroit
être dangereuse. Ne tenez proim
la tête d'une plus haute que la
ligne horizontale attendu que le
sang qui flue dans le moment de
l'opération peut couler dans la
trachée-artère et suffoquer
l'animal. C'est ce qui est arrivé
plusieurs fois à des maréchaux
ignorants et opérant ainsi le cheval.
Les instruments dont l'artiste
doit être pourvu sont



Abrolument Comacris à cette
opération, Celle-ci sont une Cuillère
des pince et une Canule apolype.
Différents Stilets sont l'un
armé d'une Sponge, l'autre d'une
pièce à Causer et un troisième
ayant toutes les Dimensions d'un
Boulon de Feu. Il faut aussi
des fils de laiton ou d'argent
recuits et de Diverses grosseurs.
ajoutez à cette préparation des
styracis amers, des acides
Concentrés et des poudres astringentes
très puissantes.

La Cuillère dont nous faisons
usage ici diffère des Cuillères
ordinaires en ce que le manche est
creux à l'effet de recevoir un des
Stilets dont nous venons de parler.

L'animal assujéti Suivant
l'art, portez dans le nez
affecté et suivez l'umeur même
la Cuillère dont il s'agit,
evitez de lacerer la membrane
prolative et de faire saigner
la fongosité, Dirigez la surface
Couverte de l'Instrument ou

Côté du nez ou la tumeur n'existe
pas et lorsqu'elle sera vis-à-vis
du polype, appliquez par un second
tém la surface concave de cet
instrument sur la partie malade
de manière à la cindre et à
l'envelopper le plus exactement qu'il
sera possible. Introduisez ensuite
le stilet dont l'extrémité sera
garnie ou de l'éponge ou du
caustique ou du cautère actuel, le
tout suivant l'espèce de polype
que vous aurez à détruire,
faites agir et séjourner le stilet
que vous aurez cru devoir choisir
aussi peu et aussi longtemps que
la nature de la tumeur paraîtra
l'exiger.



Le liquide dont on charge
l'éponge et le feu dont on joint
le bouton de métal peuvent ne
suffirent pas pour opérer l'effet
qu'on desire, retirez les stilets
trempés d'une part l'éponge
dans le liquide indiqué et, de
l'autre, faites chauffer le bouton
en répétant la même manœuvre

autant de fois qu'il veut
Il paroitra Courable, mais ayest
attention que la Cuillère ne
s'Echauffe pas par des introductions
repetées du Fer Chaud une
Brûle pas la partie saine et
opposée de la membrane d'aud
L'Épaisseur de laquelle est le mal.
Dane & cas retirez la Cuillère
Trempet-la dans l'eau Fraîche,
Introduisez-la de nouveau et
Continuez-en ainsi

Si le mal est dans la bouche
Vous agirez avec plus de Sécurité
à la faveur du pas d'âne qui
maintiendra les mâchoires écartées,
mais prenez garde que les barres
et le palatin ne s'offensent par
la Dureté des branches qui
s'opposent à leur rapprochement.
Laissez ces mêmes branches le moins
longtemps qu'il vous paraîtra possible
et rendez-en la pression moins
Douloureuse en les garnissant avec
du linge fin et en partie usé,
ou avec Suffisante quantité
de Sillane

Il en est deux manières d'extirper le
polype, la forme de l'instrument.
Détermine l'extirpation pour l'une
ou pour l'autre.

A-t'il une base étroite ou
une espèce de pédicule, prenez
une Canule ou de fer, ou de Cuivre
ou d'argent d'une forme cylindrique
legèrement tranchante du côté de
l'extrémité qui doit atteindre le
polype, qu'elle ait 18 pouces
de longueur sur 3 ou 4 lignes
de diamètre, garnissez-la d'un
fil double de laiton ou d'argent
que l'on que ce fil forme une repous-
se Dépassant l'extrémité tranchante
de la Canule, que la forme de ce fil
soit moyenne, s'il est trop épais
il résistera trop, s'il est trop
mince il pourra casser ou il coupera
trop net la tumeur et alors
l'hémorragie sera plus considérable
et plus dangereuse. Les deux
extrémités de ce fil doivent dépasser
l'extrémité supérieure de la canule
de quelques travers de doigts, elles
doivent aussi être tournées &



en forme d'ambeau ou d'écrimée
en forme de poignée afin de
les saisir et les tirer avec plus
de facilité et de force. Ces
anneaux ou cerceaux doivent
être construits de manière à
pouvoir être facilement défaits
à l'effet de dégager le fil
si le cas y étoit.

L'animal assujéti ainsi
que nous l'avons dit, portera
l'instrument dans la cavité
affectée, embrassera le tumeur avec
l'une forme par la réunion de
son de fil, appliquera l'extrémité
Grande de la canule le plus
près de la base du polype qu'il
pourra s'y prêter, tiendra avec
force et assurance l'instrument de
la main gauche, agira de la
droite, tirera les extrémités
annulaires du fil denté avec
jusqu'à ce qu'il aient été coupés
et séparés l'un de l'autre
auxquelles elle adhère. Si elle
résiste à cet effort tordra les
bords de fil sur eux même

Jusqu'à ce que l'extirpation
soit faite. le polype se
sépare pour l'ordinaire à
l'extrémité traînante de la
caule, mais s'il en reste il
sera entraîné par l'autre et
suivra l'axe de l'instrument.

Le Polype a-t-il une base
crassée l'instrument doit vouloir
vouloir vous servir glisseroit
et vous ne pinceriez tout au plus
que l'extrémité ou le sommet de
l'excroissance. agit donc comme
à des tentes pour les murs
creusés en gouttières dans leur
grainure et qui seront hérissés
d'aspérités pinceront et saisiront
avec justesse tout ce qui excèdera la
surface de la membrane et sur
laquelle réside le mal, dirigez
cet instrument sur le polype
saisinez le tout le plus près
de la base que faire se pourra,
donnez quelques coups de main
de droite à gauche et de gauche
à droite afin de l'ébranler,
de le détacher et de l'extraire.



Port à quoi vous parviendrez
Après 4 ou 5 demi-tour de
main en agitant de haut en
bas avec assez de force pour
occasionner la rupture et la
Séparation des racines qui fixent
et qui attachent le corps.

L'extirpation faite, examinez
s'il ne reste pas encore quelques
lambeaux ou quelques parcelles de
la Tumeur afin de les extraire
en portant de nouveau la même
Becette.

L'opération faite lancez
dans la Cavité opérée les
Injections Stiptiques, Détensives
et Contortives que l'état de
parties vous suggérera. Si
l'hémorragie est forte, portez
des Vaisseaux ouverts et
arrêtez plus efficacement. Si vous
êtes dans l'obligation d'employer
les aides soulevés, portez-les
sur le lieu. Devis à la façon de
la Cuillère ardue ou Stilet à
l'éponge.

Il est de Hemorragies qui résistent
à tous les moyens et qui ne cèdent
qu'à des saignées et
plus souvent à des saignées répétées
à des Douche d'eau fraîche abondante
Versée de haut sur la tête
et notamment sur le frontal et les
os du nez, à des gargarismes,
à des injections et à des bruyères
Stiptiques et surtout au Topique
Composé d'un mélange de poudre
très fine d'alun de roche et
d'agaric que vous enfermez
entre deux linges fins, moles, en
parties usées et très claires.
Vous observerez cependant que
le côté opposé de la Cavité ou
est le mal. Neveu savoir de
proche d'appui exige que la tête
de cette espèce de coussinet soit
de ce côté beaucoup plus serrée
sans être dure afin de prévenir
les effets de la Stipticité des
poudres sur des parties qui
n'en ont nul besoin et sur
lesquelles s'hydrocrimentera dangeux.



Les Mouvages et les gargarismes
aigus, attendu leur action
immédiate et nuide, suffisent
ordinairement pour arrêter
et arrêter l'hémorragie de
la gorge.

Le sang arrêté multiplie
l'animal à la place, il
importe qu'il garde le plus
parfait repos. Si c'est un
cheval il faut qu'il ne se
couché point qu'il soit attaché
au râtelier; les uns et les autres
peuvent être nourris avec des
aliments pour la mastication sou-
daine, ajoutant à l'eau de Chaux
première dans la boisson, et
stipitiques dans les aliments et enfin,
avec la plus grande attention
d'éviter toute action qui
pourroit agiter les liquides et
les déterminer sur les parties
opérées et le jusqu'à ce que
la consolidation de ces mêmes
parties soit parfaite.

Quelques laxatifs molliens
Gendront le ventre libre &
en prévindront les effets
de la Constipation qui
Me seroit point etonnant
ici attendu le traitement &
le régime reprenant le cours
auquel j'estois indispensable
de soumettre ces malades.



Operation de l'hypo-vertébratomie).

Une collection de matière Suppurée
le plus souvent assez fluide, mais
plus ou moins colorée, quelquefois
inodore et quelquefois fétide renfermée
dans les poches membraneuses qui occupent
et remplissent l'Intervalle que les hyoïdes,
le larynx et la partie antérieure de la
première vertèbre Cervicale laissent
entr'eux. donne lieu à l'opération dont
il s'agit. Ces poches communes à tous
les quadrupèdes et que l'on trouve
aussi dans les poules, les poules d'Inde &c.
n'avoient jamais été approchées par les
auteurs dont les ouvrages ont précédé
ceux qui sont sortis de nos écoles
et qui ont fait éclore cette multitude
d'écrits à la faveur desquels les hommes
les plus ignorans ont acquis une sorte de
Credat et en imposent à des esprits
à la vérité dénués de toutes lumières.
elles sont amples et répondent aux
Gonpes d'Eustache; les cloisons qui les
divise résultent de leur adomment
immédiat; recouvertes latéralement par
les parotides, par les carotides
externes, par le grand et le petit

N'est l'ingrès par la portion charnue
du muscle Stito-maxillaire, elle se
fait en quelque sorte inévitable
et il n'est possible d'y pénétrer qu'au
travers de toutes les parties aussi
délicates qu'elles sont essentielles à la vie.

L'humour dont elles se remplissent conséquemment
à ce que l'on peut appeler une véritable
Crise, ne sauroit être renouvelée et le
voies de la résolution est ici impraticable;
nous n'avons donc d'autre ressource pour
les vider que celle de l'opération et ce
moyen difficile exige beaucoup d'habileté
et de Commanence.

Leur Blennorrhée arrive dans la gorge,
la fausse gorge, la morfondure, d'abord
de certains forçats, dans la morve &c. &c.
elle s'annonce par la difficulté de la
respiration, par l'obligation dans laquelle
est le malade d'allonger le col et la
tête, par l'ouverture excessive de la
bouche, par le larmoyement, par la
tension spasmodique des muscles
inspirateurs tant des narines que de la
poitrine et par tout ce qui dénote
un état contraire et violent; Ces
proches forçats aussi alors de chaque
Côté de la mâchoire postérieure



et sous les parotides des Tumeurs dont
la saillie est assez marquée et dont
la fluctuation est trop sensible pour
laisser à l'artiste le moindre sujet de
Doute sur l'existence du mal; il
est rare au surplus que ces Tumeurs
soient accompagnées d'inflammation,
de Douleur et de Emission.

Diférer l'opération d'is que la
maladie existe dans l'espérance
d'obtenir une collection plus complète
et une formation plus parfaite du pus,
C'est Exposer l'animal à une
Suffocation certaine et d'ailleurs
L'ouverture de ces Tumeurs ainsi que
l'Evacuation du liquide qu'elles
contiennent ne sauroient s'opposer
à l'accomplissement du degorgement de
l'humour qui erre et qui circule encore
dans la mane, elles ne peuvent que le
faciliter au contraire par l'aisance
rendue à toutes les parties de l'arrière
bouche.

Les Instrumens propres à cette
opération sont des Scalpels à lame
droite très affilée et à deux tranchans,
des pinces anatomiques, une Seringue

moienne garnie d'un Cube à olive percé
de plusieurs ouvertures assez amples; des
aiguilles enfilées de brins de fil ciré,
plusieurs morceaux de plomb laminé de
diverses grandeurs, des Camilles &c

Abbaté l'animal avec toutes les
précautions que son état de foiblesse
ainsi que les anxiétés qu'il éprouve exigent,
s'il est possible de le tenir d'une

— Justau qu'il sera couché naturellement,
vous observerez les effets de la Commotion
Suite Inévitable de sa chute, qui, quelque
légère qu'elle soit, est toujours à redouter
en pareil cas. Il vaudroit mieux
souléver l'animal par des cables fixés
à des sanglons passés autour de son
corps, tirer ses jambes de côté &c
qu'il sera suspendu &c le descendre
ensuite doucement sur une bonne
litière. quoiqu'il en soit l'animal
abattu d'une manière quelconque,
amortissez sa tête sur une botte
de paille &c faites le maintenir
par un ou plusieurs aides.

Incisez la peau de trois ou
quatre travers de doigt de
longueur Directement au devant



De l'apophyse transverse de la première
vertèbre cervicale en suivant la
direction de cette même apophyse.
Armés - vous d'un Scalpel et des pinces
anatomiques, d'inégales et séparés le
bord Postérieur de la parotide dans
la direction du muscle. 3^{ème} de l'oruelle
externe à l'effet de découvrir la portion
Charnue du muscle Stilo - maxillaire
qui est au dessous, Longés dans
la substance de ce muscle directement
dans son milieu pour pénétrer la
poche dans laquelle existe la matière,
pénétrés dans le foyer, mais dirigez
la lame du Scalpel de manière à
séparer simplement les fibres
Charnues, penchez légèrement la
main du côté de l'apophyse transverse
de la première vertèbre cervicale à
l'effet de Diriger la pointe de
l'Instrument entre la Carotide
Interne et l'aune formée par la
8^{ème} et la 9^{ème} paire de nerfs.
À leur Sortie du Crâne: dès
que l'Instrument sera arrivé dans
le foyer, la matière s'échappera;
Introduisez alors le doigt indicateur

amurez-vous de la Situation précise
des nerfs et des artères, prolongez
et agrandissez l'Incision autant
qu'il vous paraîtra nécessaire
à la faveur de ce même doigt
qui vous servira de conducteur.

Vous pouvez encore pratiquer cette incision
plus inférieure, C'est-à-dire, directement
au dessous du Stilo-maxillaire, alors ce
muscle restera intact, la Section de la
carotide et du nerf Lingual en est ici plus
à craindre que dans la méthode
précédente. on peut néanmoins éviter
certaines artères et nerfs en
dirigeant l'instrument obliquement de
bas en haut et de derrière en avant;
Cette Dernière obliquité est nécessaire
pour ne pas atteindre l'artère occipitale
et la jugulaire interne qui marchent
au devant de l'apophyse transverse de
la sixième vertèbre cervicale.



Quelle route que vous ayez prise
il faut indubitablement vuider la
poche, vous y parviendrez en
introduisant le tube de la Seringue
et en pompant l'humour. Si la
matière est trop épaisse vous

Injecter de l'eau tiède très pure
Sur une pinte de laquelle vous
aurez ajoutée une once d'Esprit
de vin, réinjecter et répéter
Jusqu'à ce que cette Partie soit
parfaitement libre et nettoyée.

On change l'animal de Côté
et on pratique la même opération
sous la parotide opposée.

Il est même plus prudent
d'attendre pour faire sortir
la matière que l'ouverture soit
faite de chaque Côté, la Paillie
et la fermeté des parties sur
lesquelles on opere rendant
l'introduction des instruments tranchans
plus commode et moins dangereuse.

Al. Surplus nous avons pratiqué
plusieurs fois cette opération sur
le Cheval sans l'effusion d'une
goutte de sang et c'est ce qui
arrive toutes les fois qu'elle est bien
faite. Si l'une des artères ^{passant} ~~traverse~~
sur ces parties est endommagée
le cas est mortel: Il faut cependant
 tenter d'en faire la ligature. si
elle est coupée transversalement

Lier chaque Extrémité en particulier;
si elle n'est qu'entamée l'aident
est moins considérable enveloppés le
lieu lésé d'un cylindre de plomb.

(voyez dans le traité des playes la manière
de remédier à l'hémorragie ou à l'hydroragie)

Dans l'un et l'autre de ces cas dont
le danger est extrême a grandine
à l'ouverture du Stilo-maxillaire et
couper le cartilagineux s'il est nécessaire,
mais prenez garde d'interrompre la
8^{me} et la 9^{me} paire de nerfs
dont la section complète ou en
partie produiroit d'autres
accidens non moins terribles.

L'opération faite il
importe de s'opposer à ce que les
ouvertures pratiquées ne se
referment afin de procurer pendant
quelques jours une sortie libre
à la matière qui se produit de
nouveau dans les poches; placés en
conséquence de chaque côté une
canule de plomb ou d'argent,
telles sont celles destinées pour
la trépanation, couvrez ces



Canules et les parotides de langes
plumasseaux imbibés d'eau de vie à
l'effet de fortifier et de rapprocher
les parties distendues, maintenir le
tout au moyen du bandage d'orimé à
Cet effet (voyez p. 19. gal. du
traité des bandages) conduisez
l'animal à sa place, donnez-lui
quelque cordial s'il en en besoin,
ne lui donnez à manger qu'au
bout de six heures et attachez-le
de manière qu'il puisse se coucher:
s'il ne le faisoit pas il faudroit
l'y obliger en l'abattant trois ou
quatre fois l'un sur l'autre et
l'autre sur l'autre et profiter
de cet instant pour passer
la poche repoussant au côté
portant.

D'Ymondun le 24 avril 1777

Monsieur et cher Maître

La cure que je viens de faire concernant
un cheval très beau et très distingué dans
son espèce appartenant à M. Clement Samuel
Nouille au portail à Orleans dont le 6^e
cheval et voiturier s'étendent sur toute la
Route du Royaume me paroît assez
intéressante pour que j'ose prendre la liberté
de vous en faire le détail.



Il s'agit d'un dépôt critique, déposé et
renfermé dans l'une des Roches d'Astruc
d'attache pour l'évacuation duquel j'ai été obligé
de faire la fameuse opération que vous avez
si bien décrite et que vous appellez
hypo-vertebrotomie.

Le Malade étoit à Vatan, c'est à dire, à
quelque distance d'Ymondun entre les mains de
marchands de cet endroit, Il avoit pour
son traitement une certaine quantité
d'huile de saurée introduite dans le

oreilles et des fumigations de genièvre,
vous sentez les effets ^{divers} ~~de~~ topique chaud
~~donc~~ ^{versé} ~~il~~ s'agit introduit dans des parties
delicates et enflammées, ainsi y avoit il attiré
fortement le sang et le esprit.

Tous les symptômes que ce malade
m'offroit étoient absolument ceux d'une
Angine interne, la respiration étoit de plus
laborieuse, la colline que l'aie éprouvoit
lors de son passage dans le larynx tant
dans l'inspiration que dans l'expiration
étoit si forte et si violente que le bruit
se faisoit entendre de très loin.

Les yeux et la membrane pituitaire étoient en
inflammés, la bouche étoit très enflammée et
pleine de save, le pouls étoit accéléré et
intermittant, le flanc étoit retrouvé et
spasmodiquement contracté, il y avoit roideur
générale dans tout le corps et inflexibilité
absolue dans la tête et l'encolure. &c. &c.
J'ai appris qu'il y avoit trois semaines environ
que l'animal avoit cessé de manger et d'abord
vous concevrez de lors à l'avenir, que le mal
devoit être nécessairement ancien.

Je ne pouvois que le champ donner à

Le malade le Secour qui me
paroissoient convenables, n'ayant point
d'instrument sur moi. Je le fis transférer
^{par iloudna dans une position}
~~chez moi~~ Il y arriva avec la plus grande
peine, ayant tombé plusieurs fois en route
et étant toujours prêt à suffoquer, sans que
pouvoir respirer, le bruit que sa respiration
faisoit entendre attira l'attention publique,
tout le monde et le propriétaire même
désespéroit de l'animal. Surtout lorsqu'il fut
dans mon hôpital tout le baccident étant
augmenté ainsi que je m'étois attendu par
l'effet de la marche, on en découra bien
d'avantage lorsque je procédai à l'opération de
la trachéotomie, l'ouverture de la trachée
artère que l'on appelle dans le pays ^{autre} ~~tuterie~~
leur paroissoit irrévocablement mortelle. Je
continuai mon opération et leur surprise fut
encore plus grande lorsque j'introduis dans
l'ouverture de la trachée une canule d'argent.



Malgré tout, however, l'opération
faite, l'animal fut moins gêné et la plus
grande partie des symptômes disparurent,
il opéra au bout de huit jours une
résolution des engorgements de la gorge, et
cette déhennification lui vint à merveille.

plus particulièrement de l'Etat du Carotide
de voir que celle du côté droit étoit plus tuméfiée
et plus douloureuse que l'autre, le premier de
ce moment que tous les accidents qui avoient
existé et qui existoient encore étoient et devoient
être le produit d'une collection de matière dans
la trompe d'Eustache de ce côté. Le détail dans
lequel vous entrez des causes qui donnent lieu à
cette collection, m'y confirma d'autant plus que
j'avois appris du propriétaire du cheval que cet
animal n'avoit jamais pu être sa gourme
malgré tout ce qu'on avoit pu faire pour en
procure l'éruption par la voie ordinaire.

Il me crut donc en droit de procéder à l'opération
de l'hyovertébrotonnie et je suivis à cet égard
les préceptes que vous nous avez donnés. Je
~~me~~ me suis par plutôt pénétré dans la poche de
la trompe d'Eustache que de la voir sortir une
quantité considérable de matière blanche et
graisse. Je fis des injections répétées dans
l'intérieur du foyer à l'effet de faciliter la sortie
du reste de la matière, la compacité étant
un obstacle à son évacuation, sous la précaution
de maintenir l'ouverture que je venois de pratiquer
ouverte, et de continuer mes injections
jusqu'à ce que sous l'effet de ces injections que
toute la matière fut absolument débarrassée.

Je laissai d'atriter ensuite la Peste, morte
 qu'au bout de trois semaines, Je fus en état
 de monter le cheval, qui avoit interiné jusqu'à
 après l'avis et lors toute la ville, parfaitement et entièrement
 guérie, non seulement de l'ouverture de la Grosse
 mais encore celle que j'avois faite au ^{testicule} ~~testicule~~
 que l'on avoit eu ~~l'incubation~~ mortelle, par
 cela fait que l'on avoit ne s'en être jamais vu guérir,
 Tel est l'homme, l'écrit l'auteur de cette
 observation que je soumette avec lumière et
 que toutes les personnes instruites, qui sont
 de mon endroit désireroient voir l'écrit public.
 Si vous l'en trouvez digne, vous voudrez bien
 l'approuver et le m'en rapporter et j'en serai
 content et sur votre prudence.

Je suis avec autant de Respect qu'avec
 reconnaissance.


Monsieur et Cher Maître



Votre très humble et
 très obéissant serviteur

Joseph P. N. de la Roche
 Vétérinaire. Membre par
 J. de la Roche.

P.S.
 J'ai par eu de voir
 vous en voyez des certificats
 de cette sorte le fait étant
 absolument public, et toute la
 ville pourra s'en assurer.



De l'opération
de l'Empiome, ou de la Paracentese a la
Poirine. /.

On appelle du même nom l'opération
et la Maladie qui y donne lieu.

Tout liquide de quelque Nature quel
soit épandu dans la poitrine doit
nécessairement en être extrait d'une
manière quelconque, si l'expectoration
et la résolution en sont impossibles.

Cette opération n'est point
Dangereuse par elle même (a) Elle
n'est mortelle que par les suites de
La Maladie, aussi l'artiste instruit
ne l'entreprend tel point si le mal est
ancien. S'il est complotique de Diarrhée,
de pourbure, de fluxion, de Morve,
de pourriture de la poitrine. Si le
Malade est dans un grand abattement,
dans le Marasme &c. mais il y a des
cas où avec succès lorsqu'il n'existe
aucun de ces fâcheux Symptômes, que
l'humour déposée ait l'effet d'une crise,
et que les Symptômes qui existent,
ne soient réellement dus qu'à la présence
Du Pus, ou du Sang, ou de la Serosité
qu'il importe d'évacuer.



(a) Nous avons injecté de l'eau tiède dans la cavité dont il s'agit, en assez grande
quantité pour établir une Empiome, qui nous a donné à peu près tous les
Symptômes de cette dernière Empiome Maladie; ces Symptômes étoient assez
pressants dans les premiers instants de l'introduction du liquide dans le
Thorax, ils se sont calmés peu à peu à mesure que la résolution avoit
lieu, le lendemain l'inspiration étoit encore un peu dégoûtée et légèrement
triste; mais le troisième jour, il étoit absolument dans l'état Naturel.

L'Épanchement d'ou il s'agit pour
aujourd'hui que nous l'avons dit. (voyez
Empiègne Maladie.) n'avoit lieu que
Dans Une des cavités coniques de la
poitrine, ou dans les deux ensemble
dans ce dernier cas les Symptômes sont
plus pressans, et la Maladie plus
Dangereuse.

Au Surplus L'inondation de parties
prochaines de la poitrine se fait
par toujours la suite et l'effet
des maux intérieurs. Des playes
pénétrantes dans cette cavité, l'ouverture
des Vaisseaux Intérieurs, la lésion
de la Cible, et des Vaisseaux pulmo-
naires, en sont souvent la cause.
Le danger de ces sortes de divisions
porte encore sur l'importance, et
l'espèce des parties lésées, et sur
le Volume et la quantité du
Liquide épanché.

Il est différentes Methodes pour
procéder au Liquide d'ou il s'agit
L'issue désirée.

Les mêmes Injections ont été faites sur deux autres chevaux
Elles ont fait naître les mêmes Phénomènes mais la paracentèse
pratiquée deux heures après a chacun a rappelé le salut, de
Manière que huit heures après, les animaux buvoient, mange-
-oient, et étoient comme cy devant.

Nous supposons qu'on se soit
determiné sur le lieu où l'on doit
pratiquer l'opération, qui est
ordinairement la partie la plus
declive, et sur la Methode à suivre.
Les precautions à prendre pour y
proceeder, sont de ne point tourmenter
l'animal par des situations gênantes,
la plus commode et la moins fatig-
ante est celle dans laquelle le malade
est debout sur ses quatre membres.
On le fixe au râtelier, on ala mengeoire
fermement par le liot. Les dettes à
former sont attachées par en partie
d'une maniere inébranlable. les montons
Les chiens et autres petits animaux
sont placés debout sur une table
peu élevée, et ils y sont maintenus par
des aides, si l'empieue est considerable
l'évacuation ne doit être que partielle
et non totale dans le même instant,
car on jetteroit le malade dans une
foiblesse qui pourroit être dangereuse.
on laisse couler jusqu'à une certaine
foiblesse marquée du poids, sans a-
rreiner les forces par quelque
Tordicue. Si on huit heures après
on procure une nouvelle évacuation
et ainsi de suite jusqu'à ce que la poitrine
soit entièrement vidée. L'empieue
a telle lieu dans les deux cavités
Lorsque de la poitrine, le thorax ne



Doit par être ouvert des deux côtés
à la fois. Des que les deux lobes se
renvoient en même temps se fontant
de la colonne d'air latérale, le poids
de l'atmosphère sur les parties
déjà débilitées suffoqueront
indubitablement l'animal.

Les instruments propres à cette
opération sont Un bistouri droit, un
bistouri courbe, Un Scalpelle, Une
pince anatomique, Un Croc quart et
Sa branche, Une Sonde de poitrine, Et
Son filet, Une Seringue garnie de tubes
de Divers grandeurs, des aiguilles
courbes et les filles de quelques brins
de fil ciré.

Pour pratiquer la paracentèse
à l'un des côtés de la poitrine, faire
Un plic à la peau suivant une
Ligne horizontale précisément à
l'oposuite du fonde, entre la Sixième
et la Septième des vraies côtes, et si
l'animal est couché devant ce qui
est assez ordinaire dans les chiens
et dans les Vétérinaires, pratiquer
ce plic plus en avant, c'est à dire,
entre la Cinquième et la Sixième côte,
mais toujours dans l'endroit répon-
dant à l'union du faistage avec
elle, dresser à ce plic Un ponce et
d'une hauteur, faire le levier d'un

côté par l'un aide, l'autre le Thorax même
de l'autre côté avec la main gauche,
armée votre droite du Coutoury droit
et insinuer transversalement, rendre la
pierre à elle même vous aurez une
Incision Verticale, de trois pouces de
Longueur, après recourir aux pinces
anatomiques, et au Scalpelle, découvrir
les muscles Intercostaux, les incisant
transversalement le péricardique charnu
et le pectoral, pénétrer dans la poitrine
à la faveur du Coutoury courbe, avoir
soigné la plaie avec le Doigt indica-
teur, afin d'éviter de lésion le poulmon.

L'instant à choisir pour pénétrer dans
la poitrine est celui de l'expiration.

Quand l'Intérieur et la Veine Choroïdique
Extérieure se trouvent dans le lieu où
vous opérez, il faut découvrir ces Vaisseaux
et en faire la ligature et la suture. le
Thorax ouvert introduire la Sonde de
poitrine, tenir le Stilet de manière
qu'il ne fasse avec l'extrémité de la
canule qu'un seul tout moufle le Vuy,
La Sonde parvenue dans la poitrine
pousser le Stilet afin d'écarter les
poulmons de l'ouverture de la Sonde
et que la Liqueur coule sans interruption.
S'il est des faillots de Sang, des grumeaux
de Matière concrète vous en facilitera
la Sortie avec le Doigt, ou avec une curette
destinée à cet effet.



La matiere qui forme l'Empiema
étant venue la suffisante quantité
appliquée dans la place, Une canule, ou
Un Bourdon, lié de compresse
Subibée de Liqueur spiritueuse, et
maintenu le tout à la faveur d'un bandage
Vous préférerez le parait car au
Bourdon la canule qui est courte et
à large pavillon. quand l'Empiema
est peu considérable, et que les forces du
malade permettent l'entière évacuation
de l'Humeur qui la compose, le
Bourdon au moyen duquel on fera
l'ouverture sera préféré, le dépôt étant
fort et le Malade étant foible; faites
prendre à l'animal après l'opération
des Cruesages coniques et subtils.

Lorsque l'Empiema est aqueux
Une simple ponction dans le lieu
Designé suffit, pour l'évacuation
Desirée, mais les poulxons courent
ici le ris que d'être Mésés pour
la pointe du Croisquant, au syne
nous servons nous de cet instrument
que pour l'Empiema logé entre les
deux Lames du Mediastin. Vous y
procederez de la Maniere Suivante.

Armez Vous d'un Croisquant
proportionné à la taille et à la force
du malade; celui destiné à ouvrir

Les grands animaux doit avoir six ponce
de canule; Vous le prendrez M. en un
Long ponce M. animal d'une lèvre
plus petite, tenir le ponce la poignée
avec force, le doigt indicateur avancé
sur le principe de la canule, plonger
cet instrument obliquement, à trois
travers de doigt du Trachant du
Sternum, à six ponce de la pointe,
c'est à dire, entre le festilage de la
première Traye fote, & celui de la
Seconde, ou entre ce dernier, & celui
de la Troisième, dans ces cas l'obliquité
du Trois quart doit être de derrière
en avant, tandis si Vous percez
entre la première & la Seconde
fote, cette obliquité sera de devant
en arrière, de manière que l'extrémité
de l'instrument répondra lorsqu'il sera
enfoncé à la face Supérieure & intérieure
Du Milieu du festilage de la Seconde
fote, qui lui précisement l'endroit où
est le fond et le centre de la cavité qu'il
supporte d'ailleurs, & retiré le Trois quart
laisser la canule, & après il soit ponce
l'évacuation, soit ponce l'aspiration
Les précautions ex devant présenter.
Si le fouda liquide lui s'interrompt
Introduire dans la canule un Stilet à
l'effet de détourner les légers flocons
qui quel que soit l'arrête.



Enfin l'Empieue a tel pour cause
La Lesion des parties exterieures ou Ma-
reours a la paracuisse qu'autant que la
Solution de continuité, est a la partie
Superieure du Thorax, et que le liquide
Epanché sejourne dans la poitrine. Si
L'artere Intercostale, est lésée, il faut
avant que de proceder a la paracuisse
pratiquer la ligature des Vaisseaux.
Voyez pour cet effet le Manuel de cette
operation C. J.

année 1774.

1^{er} Bazar des opérations
du pied.

Opération du javart sucorné

Le javart sucorné est le seul qui exige une véritable opération, le javart tendineux & profond demande quelquefois une simple incision faite aux téguments à l'effet de donner issue & de frayer au pus une route au dehors, mais le javart simple n'a besoin que de la nature & de quelques légers secours de l'art pour se dissiper entièrement.

Toutes les parties du pied sont également sujettes aux javarts dont nous prétendons parler ici, mais les impressions sur elles ne sont pas toutes également dangereuses; leur situation, leur nature, leur densité & leur mollesse en rendent les effets différents. celui dont le siège sera dans l'épaisseur de la fourchette molle, ou dans le corps gras & spongieux logé sous cette même fourchette & entre les talons est plus à craindre que celui qui n'occupe que la superficie du réseau formant le bourlet qui entoure la couronne; quand il attaque les feuillettes de la paroi ainsi que vers le corps de l'os du pied il est très douloureux, mais moins dangereux que s'il a porté atteinte à l'un des cartilages latéraux; lorsque le pus a détruit le ligament capsulaire de



l'articulation, qu'il a pénétré entre les
abouts, qu'il a corrodé les cartilages —
lisses et polis qui dependent des surfaces
des pieces articulées le mal est incurable
et l'animal est irrévocablement perdu.
au surplus la boigne ou la malignité
de cette maladie est encore augmentée
par l'état actuel des humeurs qui
circulent, par le plus ou moins —
d'ancienneté du mal, par le traitement
que peuvent avoir employés les —
médecins et enfin par les causes qui
l'auront occasionné.

quelque soient les parties de pied
que le jarret oupe on ne peut se
dispenser d'opérer, parce qu'il s'agit toujours
d'en découvrir le foyer, de faciliter —
l'écoulement de la matière suppurée
et d'extraire et de solliciter la chute
des parties solides qui en sont le siège
et qui doivent s'exfolier. La plus —
laborieuse, la plus difficile et la plus —
dangereuse des opérations a pratiquer
est celle qui doit se faire sur l'un
des cartilages latéraux, car ils sont —
rarement tous les deux atteints; on
se contente dans les autres cas de
découvrir le mal, mais dans celui-
cy il faut nécessairement aller au delà.
les cartilages dont ils s'agit une fois —
intéressés s'exfolient difficilement, nous

Trouvons toujours des arrières explications, —
si j'en ai ainsi parlés, qui forment dans le tissu
même ou l'ulcère est en quelque sorte
regardé comme guéri, des fistules qui
obligent à de nouvelles opérations presque
toujours aussi infructueuse que la première.
La maladie se complique, la forme du
pied se dévoie et le mal est bientôt
au dessus des forces de la nature et du
pouvoir de l'art. on prévient ces accidents
et ces accidents en extirpant en entier
et dans le même temps le cartilage
affecté, mais cette opération qui exige
ainsi que nous l'avons observé
beaucoup de lumière et de dextérité
de la part de l'artiste est un moyen
très sûr et très prompt pour mettre fin
à cette maladie, c'est un fait dont
une expérience journalière nous
garent la certitude. il a été inconnu
aux médecins parcequ'ils ni la
garde, ni la témérité ne peuvent
se imposer tenir lieu de savoir et que
d'ailleurs il faut une sorte de fond pour
mettre à profit les leçons de l'expérience.

nous ajouterons que ces mêmes
cartilages peuvent être offensés par
l'autre cause que par des jarrets.
Le pus qui fournit un crabeau,
une seyme, des blymes et d'autres
ulcères qui affectent l'intérieur du
pied peut les atteindre et les corroder



l'articulation, qu'il a pénétré entre les
abouts, qu'il a corrodé les cartilages —
lisses et polis qui dependent des surfaces
des pieces articulées le mal est incurable
et l'animal est irrévocablement perdu.
au surplus la Béquignette ou la matignette
de cette maladie est beaucoup augmentée
par l'état actuel des humeurs qui
circulent, par le plus ou moins —
d'ancienneté du mal, par le traitement
que peuvent avoir employés les —
médicaments et enfin par les causes qui
l'auront occasionné.

quelque soient les parties de pied
que le jarret oupe on ne peut se
dispenser d'opérer, parcequ'il s'agit toujours
d'en découvrir le foyer, de faciliter —
l'écoulement de la matière suppurée
et d'extraire et de solliciter la chute
des parties solides qui en sont le siège
et qui doivent s'exfolier. La plus —
laborieuse, la plus difficile et la plus —
dangereuse des opérations à pratiquer
est celle qui doit se faire sur l'un
des cartilages latéraux, car ils sont —
rarement tous les deux atteints; on
se contente dans les autres cas de
découvrir le mal, mais dans celui-
cy il faut nécessairement aller au delà.
les cartilages dont il s'agit une fois —
intéressés s'exfolient difficilement, nous

Trouvons toujours des arrières explications, —
si j'en ai ainsi parlés, qui forment dans le tumeur
même ou l'ulcère est en quelque sorte
regardé comme guéri, des fistules qui
obligent à de nouvelles opérations presque
toujours aussi infructueuse que la première.
La maladie se complique, la forme du
pied se change et le mal est bientôt
au dessus des forces de la nature et du

voir de l'art. on prévient ces occultes
accidens en extirpant en entier
quelles que soient les parties, le même, tous le cartilage —
et, mais cette opération qui exige
que nous l'avons observé —
ou de lumière et de dextérité —
et de l'artiste est un moyen —
et très prompt pour mettre fin
à maladie, c'est un fait dont
l'expérience journalière nous —
té la certitude. il a été inconnu
caré pour parce qu'il n'y ni la —
ce, ni la témérité ne peuvent
tenir lieu de savoir et que
il faut une sorte de fond pour
à profit les leçons de l'expérience.

us ajouterons que ces mêmes
cartilages peuvent être offensés par —
l'autre cause que par des javarts.
Le pus qui fournit un crabeau,
une seyme, des bleymes et d'autres —
Mieux qui affectent l'intérieur du
pied peut les atteindre et les corroder



Et alors le mal est d'autant plus —
redoutable qu'il equivaut à un ou
deux javarts encornés dont il ne
sera possible de triompher que par
l'enlèvement et l'extirpation de ces
parties lésées. nous avons ^{été} ~~encore~~
obligés d'en venir là après des sections
accidentelles faites à ces parties en opérant
dans le talon.

avant que de procéder à l'opération
du javart encorné, il est des attentions —
à avoir; les unes regardent le malade —
général et les autres regardent la partie
lésée en particulier.

mettre l'animal au régime, saigné,
donnés des lavemens emollients, donnés des
breuvages tempérés et delayants. N'vous
soubornés le temperament vicieux, purgés,
depurés la masse. ne perdez pas un instant,
occupés vous pendant le temps du régime
et de l'administration des remèdes préparai-
toires à disposer la partie malade —
à l'opération. le tiffus spongieux des
talon est il le siège du mal? préparés
la sole solide à être enlevée (voyez l'opér.
de la sole) mettez un feu très léger et
très déagré, faites prendre un ruban
mou et fin et appliquez à la partie de
l'aine un cataplasme emollient gras.
ces remèdes seront employés dans —
tous les cas, nous n'en ferons plus —
mention, il en sera de même du point
que l'on ne doit pas omettre de couper

autour de la couronne et du paturon. —
Le javart s'élève-t-il sur le vaseau de la
couronne ? par là le pied n'est pas fond et
appliqué un fer très mince. Est-il situé
entre l'os et la paroi ? par là comme
dans le cas précédent, remettre la paroi
comme dans l'opération de la scyme. —
(voyez en l'emmanuel...) et mettre un
fer ébranlé dans le lieu répondant
à la partie malade. Est-il question enfin
de la lésion d'un des cartilages latéraux,
abattre la paroi et la sole jusqu'à la partie
demi vive, ajuster et fixer un fer
à demi lunette afin de laisser le quartier
malade à découvert, remettre jusqu'à au-
rès la paroi sur le quartier affecté —
depuis le talon jusqu'à la manette —
en suivant la direction du bord inférieur
du cartilage qui est enfoncé dans
l'ongle à un pouce de la couronne
et dans une direction parallèle à celle
de cette même couronne, entailler —
enlever cette même paroi avec la
venette dans l'endroit de la manette,
directement à l'extrémité de la première
entaille, mais dans une direction
verticale et de manière que cette
seconde entaille se trouve perpendicu-
lairement sur la première et ne la
passe pas, les limites devant être
renfermées entre celle-ci et la couronne.



Les humeurs du foyet tempérées,
adoucies, depurées, la partie malade
suffisamment relâchée et les douleurs
apaisées, procédés à l'opération que le
javant exige. nous croyons devoir
ne faire mention ici que de celle qui
a rapport à l'entèvement du cartilage.
le manuel des autres se trouvera
suffisamment décrit dans l'extirpation
du corps pyramidal de la fourchette, —
dans l'entèvement de la scymme, et —
D'ailleurs comme il n'est question dans
tous ces cas que de donner issue à la
matière, de prévenir et de détruire
les clipeurs qu'elle auroit pu former,
la manière d'agir sera dictée par
la circonstance à tout artiste instruit
de la structure, de l'usage et de
l'importance des parties.

nous ne devons pas omettre le
détail des instruments et des choses que
l'élève doit avoir scrupuleusement
préparées et rassemblées avant que
de procéder à l'opération qu'il médite.
il garnira donc artistement un grand
plat d'étain de feuilles de sauge de
diverses grandeurs, d'une gouge, de
venettes à droite et à gauche, de bistouris
droit et courbe, de scisciaux droit et
courbe sur plat d'un boutoir à
opération, de deux scalpels, d'une

pince anatomique, D'un bec de
corbin, D'un tourniquet, D'une sufi-
sante quantité d'esprit de vin, de
camphre, D'une bande roulée a-
deux chefs faite D'un ruban de fil
de 4 aulnes de longueur sur deux
pouces de largeur, de plumaceaux
gradués, D'étoupe de lins et d'une enveloppe.
il faut aussi des onguents anodins pour
mettre autour du pied.

Les choses ainsi préparées faites
fixer l'animal, qui doit être à jeun, dans le
travail, ou pour opérer plus sûrement et plus
commodément abattre le fureur une bonne
litière; que sa chute s'effectue du côté
gauche si vous avez à opérer l'un des
quartiers de dedans du bipède du montoir,
ou l'un des quartiers de dehors du bipède
opéré; mais si c'est l'un des autres quartiers
qui soient affectés, faites le couger sur le
côté droit; le pied malade appartient-il
à l'une des extrémités antérieures fixés le
en attachant le canon de la jambe, à la
quelle il répond sur la partie inférieure
du tibia, c'est-à-dire, au dessus du jarret
et s'il dépend de l'un des membres
composant le bipède postérieur appuyés
le au dessus du genou, mais de manière
que la partie opérée soit dégaîné et
néanmoins très appuyée dans la crainte
qu'elle ne glisse et ne descende près du boulet
lors de quelques mouvements de défenses



de la part de l'animal. mettez le tourniquet
dans le paturon et opérez.

armés vous de la renette, rassemblez
les entailles pratiquées ci-devant à la
parois et renettez jusqu'à ce que vous
ayez atteint les parties molles, faites
parvenir la pointe du bistouri
courbe dans ces entailles et incisez
les feuilletts qui unissent cette même
parois au pied; pratiqué avec
le bistouri droit une incision au moyen
de laquelle vous ouvrirez le
tegument à la naissance de la couronne
à compter de la pointe du talon à la
manière, faites une seconde incision
sur ce même tegument, mais
dirigée la perpendiculairement à la
précédente, tirez la de la partie
moyenne du bord supérieur du
cartilage et de manière qu'elle forme
avec cette même incision pratiquée
à la couronne deux angles égaux.
saisissez ~~chaque~~ chacun de ces angles,
l'un après l'autre, avec les pinces
anatomiques, disséquez les avec le
scalpel jusqu'à ce que la portion du
cartilage hors de la parois soit entièrement
à découvert: toute l'attention consiste
ici à diriger les coups de scalpel le plus

près du cartilage, qu'il est possible à l'effet
de laisser à ces portions soulevées du
cartilage, tegument plus d'épaisseur et
par conséquent plus de moyen de fournir
à la cicatrice. achevés ensuite de découvrir
la surface extérieure du cartilage,
soulévés pour cet effet la portion de la
parois qui a été renversée et qui en
revient le bord inférieur. prenez
le scalpel, faites le pénétrer du côté
de la couronne entre la face interne
du sabot et la face externe du cartilage,
incisez tous les feuilletts qui unissent
ces parties, saisissez la parois du côté
du talon avec le bec de corbin, soulevés
là et renversés là en penchant la
main du côté de la pince, disséquiez et
renversés toujours jusqu'à l'enlèvement
total de cette portion de l'ongle.

Le cartilage a découvert muni des
à son extirpation, soulevés le du côté
du talon, ou du côté de la pince, ou
par le bord supérieur, disséquiez le en
dessous au moyen d'un Scalpel à deux
tranchants, saisissez le dès que vous le
pouvez avec le bec de corbin, ou avec
une errine, agissez toujours avec le
scalpel et continuez d'une part à le



Soulever et de l'autre à disséquer et
ce jusqu'à son entière séparation.
de quelque côté que vous ayez saisi
ce corps pour l'extraire, il faut avoir
soin de ne pas offenser le tendon
large et aplati des muscles extenseurs
du pied contre lequel l'extrémité
antérieure du cartilage s'attache;
ayez encoir la plus grande attention
de ne pas intéresser le ligament
capsulaire de l'articulation de l'os
de la couronne avec l'os du pied, —
dirigés en conséquence vos coups de
scalpel le plus près du cartilage qu'il
vous sera possible, il est d'autant plus
facile d'ouvrir ce ligament qu'il
adhère très étroitement au corps
cartilagineux dont il s'agit, qu'il est
uni aux parties qu'il recouvre d'une
manière assez lâche et qu'il est lui-même
très fin. Dès qu'il est brisé l'écumeur
synoviale s'écoule, si une portion
de la capsule a été enlevée, l'accident
est plus grave que, si elle étoit
simplement incisée. il est une autre
manière d'opérer dans laquelle on
risque moins d'ouvrir cette membrane,
entamer le cartilage dans la partie
moyenne, directement au droit de

L'articulation au moyen d'une feuille de
sauge a lame étroite et très affilée; élever
cette portion moyenne d'un bord à l'autre
par lames minces et déliées et ce
jusqu'à ce que vous ayez entièrement
mis la membrane articulaire dont il
s'agit à découvert. procédez ensuite à la
dissection et à l'extirpation des deux
portions restantes du cartilage, le tout
conformément aux dimensions que
nous avons prescrit.

il est bon d'observer qu'il reste
toujours dans l'une et l'autre de ces
manières d'opérer quelque portion du
cartilage à l'endroit où le corps adhé-
re au pied, élever les très exactement
avec une pince, ou avec la carne
du bistouri à opération. le premier de
ces instrument doit être légèrement
courbe sur plat et le bistouri doit
avoir une lame très courte à l'effet
de pouvoir suivre le cambré léger que
l'on observe dans la partie supérieure
et latérale de l'os du pied. S'il est des parties cartila-
gineuses isolées çà et là il faut les extraire
et les élever avec des pincettes courbes sur
plat.

Le cartilage soigneusement élevé,
ôtez le tourniquet, déliez le membre, laissez



Saigner, reprenir & retenir de nouveau
ce même membre, placé encoir le
tourniquet & appliqué l'appareil convenable
prendre garde de comprimer trop fortement
le membre de peur que vous ayez
compromis, placé le sutur. du plumaceau
imbibé d'esprit de vin spiritueux, comprimer
plus fortement endroit de l'articulation que
vous aurez aussi garni de plumaceau
imbibé d'esprit de vin à l'effet de
maintenir toujours le ligament, envelopper
le pied de large étoupades chargées de
substances grasses & calmantes, mettre
l'enveloppe, saigner le malade à la
jugulaire & placé le dans l'écuelle
sur une bonne litière & qu'il n'ait
pas à manger de quatre heures.

Si le ligament capsulaire est
ouvert placé sur le lieu de la lésion
un plumaceau chargé d'une espèce
de pâte, faite d'un mélange de
camphre & d'esprit de vin, ou bien
mettre un plumaceau imbibé de teinture
d'aloë fortement chargé de poudre
d'aloë. vous aurez attention de laisser
tomber ces substances voisines de celles
mêmes & de ne point les ôter lors des
premiers passages. /.

Opération de la seime

cette opération consiste dans la destruction ou dans l'enlèvement de la parois de l'ongle qui se trouve divisée, et l'on sait que c'est cette division qui constitue la maladie dont il s'agit.

il est deux moyens de la pratiquer, par le feu ou par l'instrument tranchant. Le premier étant employé c'est de la suppuration et de la chute de ~~l'ongle~~ l'éclaire des parties brûlées que dépend la réunion des parties divisées et par conséquent le succès que l'on attend, et quant au second l'effet désiré tient simplement à une nouvelle reproduction de la portion retranchée du sabot.

Le cautère actuel est la seule méthode prescrite par les auteurs en maréchalerie et par conséquent la seule pratiquée par les maréchaux, mais il ne peut remédier ~~qu'à~~ qu'aux pimes superficielles, il est absolument insuffisant lorsqu'elles sont larges et profondes, et d'ailleurs ses effets sont nuisibles si la maladie est ainsi qu'il arrive souvent accompagnée de douleur et de chaleur.

Lorsque cette maladie est benigne, que la cause est légère, on pratique



L'opération des que l'occasion l'exige
mais si l'animal souffre beaucoup, si il
y a inflammation, si le sujet est délicat
&c. il est essentiel d'y préparer la partie
par des substances relaxantes et calmantes
et d'y disposer le malade par la saignée
des breuvages et des lavemens tempérés
et si l'on soupçonne quelque vice dans
les humeurs, si la cause du mal est divine,
par exemple, l'action d'un virus —
propre, il faut nécessairement débiter
par un usage méthodique des dépuratoires
et des purgatifs.

abattre la paroi le plus qu'il vous
sera possible, par la pince et la fourchette
jusqu'à la partie demi-vive, attachez un
fer très mince et peu couvert, si la scime
est située sur le quartier ou sur le talon,
longue l'éponge répondant à la partie
malade, l'éponge longue doit être mince
et coupée en biseau; il ne faut pas aussi
qu'elle dépasse la scime, elle doit au con-
traire être un travers de doigt plus —
en arrière à l'effet de découvrir le mal
et de faciliter ensuite l'opération et les
pansements. Si elle est située en prime et
qu'elle constitue ce que l'on appelle soye
ou pied de dœuf, faites un anneau —
si l'on et mettez un fer long dans
cette partie du pied, tel est celui destiné
aux extrémités postérieures des chevreaux
qui forgeront, faites le poil autour de la

couronne, agglutinant l'animal d'une manière
quelconque, souvent on l'opère à la main
à la faveur d'un torchon.

armés vous du cautère effiforme,
que vous aurez fait chauffer jusqu'au
point de rougir (voyez la cauterisation),
appliquez le transversalement sur la
partie supérieure de la couronne —
directement à la naissance de la
division, laissez séjourner le cautère
jusqu'à ce que la peau soit brûlée
et que les parties ignées aient pénétré,
pénétrées le tissu cellulaire, placez
une seconde S de fer directement
sur la division à un travers de
doigt de la précédente, brûlez jusqu'au
~~tissu~~ tissu feuilleté.

nous ne pouvons nous dispenser
d'observer ici que la nouveauté
de la forme de cette espèce de
cautère n'est pas évidente, elle a
été seulement imaginée pour croiser
la sème dans plusieurs sens, mais
c'est précisément ce que cet instrument
ne fait pas et ne peut faire. il
seroit long et inutile d'en déduire les
raisons. En pareil cas nous nous
sommes toujours préférablement
et très utilement servi d'un
cautère représentant un V consoime.



des jembes du
second cauter
rencontre les
extrémités de celles
de la première conforme
tracées

nous appliquons celui-ci sur le bord
supérieur de la paroi, en sorte que
les extrémités des jembages de cette
lettre répondent directement sur la
ligne de la couronne et que la
réunion des deux branches de cet
entre dans ^{la} division de l'angle; nous
faisons reschauffer ce même cauter
et nous l'appliquons de nouveau, —
mais dans un sens contraire et —
de manière que les extrémités de
celles de la première conforme tracée.
alors les angles aigus répondent à la
division de l'angle et les angles obtus
sont traversés par le bord supérieur
de la paroi, c'est à dire, par la —
couronne. La première application
du cauter doit être plus forte et
plus continuée que la seconde, —
dans l'une nous avons toute l'épaisseur
du biseau de la paroi à pénétrer, —
dans l'autre nous n'avons à agir que
sur les teguments, on a tourné et —
poussé légèrement la main en contre-
bas dans le tiers de la première de
ces cauterisations afin de brûler —
également le sabot qui est attendu
son biseau beaucoup plus épais à
quelque lignes de son bord supérieur.

cette opération peut être également
faite avec un simple cautère alame-
courte et droite que vous placerez et
dirigerez de manière à desirer ces
doubles , vous procurerez une
escharre de la peau et de l'ongle et
c'est précisément la fin que vous
devez vous proposer et à laquelle vous
arriverés plus sûrement et plus promp-
tement que par le voyage du cautère
effigé.

L'opération de la peine par
l'instrument tranchant consiste dans
l'enlèvement totale des parties divisées
de l'ongle. armez vous d'une venette
bien tranchante, incisez la parois de fait
subas dans toute son épaisseur et
jusqu'aux feuillettes à un travers de doigt
de la division que forme la maladie
dont il s'agit, pratiquez en autant au
côté opposé, de manière que la peine
se trouve alors située à distances
égales et marchent parallèlement
aux incisions pratiquées; prenez un
bistouri, armez vous d'inciser les feuillettes
que la venette n'a pû atteindre,
incisez aussi la couronne. D'une
mainure à l'autre, faites parcourir
la pointe du bistouri entre le biseau



Et le Bourlet, si la seime n'est pas
complète, arcevis de la separe par
quelque coup de renette et même
avec le bistouri s'il en est besoin,
saisissez avec le bec de corbin l'une
des portions de la parois separee
du coté de la couronne, n'arrachez
pas cette partie, mais separez la
en la disseyant d'une main
à mesure que vous agirez de
l'autre avec la tenette; pratiquez
la même manœuvre à l'autre
portion de l'ongle, nettoyez la place
de toutes les portions de parois qui
peuvent y être restées ou de feuillets
maierés et pouris que vous y
rencontrerez; mais si l'or du pied est
boulevé et presente une faille longue
et étroite qui remplisse la seime
ainsi qu'il arrive assez souvent à la
soye, alors brulez cette partie qui
faillit dans toute son étendue à l'effet
d'obtenir une exfoliation assez forte
pour egaliser la surface de l'or. Toute
l'attention à avoir ici est d'éviter
d'endommager la parois et les feuillets, pour
cet effet deffendez ces parties en les
garentissant d'une lame de fer que

vous placerez et que vous ferez maintenir
par un aide, sur chaque un des cotés
de la paroi divisée, ayez le plus grand
soin de faire repousser ces lames dans l'an
fraîche a mesure qu'elles s'échapperont.
ces opérations faites, procédez au
pansement et a l'application de l'appareil
convenable.

Dans le cas de la cauterisation
de l'ongle employez un suppuratif
quelconque, mettez autour du pied
un cataplasme émollient.

Dans la circonstance de l'amputation,
de la même remplissez le vide de la
plaque par des pharnaceaux indissolubles
l'essence de terrebenline et
enveloppez le pied d'étoupe
chargée d'onguent populeux.

Si vous avez été réccité de
cauteriser l'os du pied, ayez recours a la
tincture d'alcoi, couvrez et enveloppez
le tout d'un cataplasme anodin,
saignez et donnez des lavemens émollients,
mettez l'animal au régime et a
l'usage des substances tempérantes
et calmantes.



operation de la Deseffure

Deseffure c'est enlever la portion inferieure du sabot que l'on nomme la sole de corne.

Les cas qui determinent le maréchal à cette operation sont ceux de l'enastelure, des oignons, des faux-quartiers, des primes, des bleyures, des solles-battues, meurtries, brûlées, dessecées, des étouffemens de sabot, des arises, des crapeaux et tous les maux enfin qui sont profonds et qui importent de mettre à decouvert. il est encore des maladies plus graves qui requierent cette operation, tels sont des abcès durs et malins qui suivent des douleurs et des convulsions terribles et qui font tomber l'ouge et perir le malade en moins de 48 heures si l'on n'y porte le plus prompt remede. c'est alors que la deseffure est instante et que le moindre retardement seroit ~~ruineux~~ funeste et dangereux; Dans presque toutes les autres circonstances le maréchal instruit et qui raisonne peut différer et la remettre au lendemain et même au surlendemain, à l'effet d'y disposer la partie et d'y preparer le malade, pour diminuer d'autant la vivacité des douleurs cruelles qui suivent toujours

cette opération et rendre la cure moins
longue & plus facile.

Les moyens préparatoires sont pour
le malade des lavemens emolliens, un
régime rafraichissant & des boissons
délayantes & calmantes.

Encepi concerne le pied paré
jusqu'à la partie demi-vive, avoir laissé
à la pouture & au milieu de la sole
la pouture qui leur a été départie, leur
consistance étant absolument nécessaire
pour faciliter l'enlèvement médié.

cernés la sole dans toute son étendue
pour tout le pied jusqu'au ~~vis~~, attachés le fer

approprié & ajusté d'après les dimensions
du pied & l'espèce de mal. si vous avez

remède à l'encasture, faites usage
du fer brisé dans le milieu des branches

(a) ^{troup} ~~vous~~ que vous aurez pratiqué
dans le paroi par le moyen des lames,

vous donneront l'avantage de l'attache
et de fixer ce fer après l'opération

sans branler, ni ébranler les parties
souffrantes. La sole parée, le fer attaché,

les schissés rassemblés, le poit autour de la
couronne & du paturon coupé, appliqués

de dans & autour du pied un cataplasme
emollient, ou anodin suivant le besoin.

Si la douleur est forte, faites usage des

(a) voyez l'essai sur la ferrure. de ~~l'essai~~ maître p. 67.



des pédilueux formés avec une décoction de
plantes plus ou moins ~~calantes~~ calmantes.

C'est ainsi qu'on doit prévenir les
accidents avant qu'on doive procéder à
l'opération. pour la pratiquer assujettir
l'animal dans le travail, ou ce qui est
à la vérité moins commode, abattre le
sur un lit de paille assez épais, fixer le
membre d'une manière inébranlable
en vous réservant cependant la facilité
de le délier promptement et sans obstacle
si le cas l'exigeoit.

Oter l'appareil et le feu, placer autour
du paturon un tourniquet dont la
compression s'opérera sur les artères
latérales, ou employer tout autre lien
assez serré pour suspendre le cours du
sang dans le pied, sans néanmoins pouvoir
blesser et engourdir toutes les portions
qui forment le paturon, ainsi qu'on
le voit dans la manière dont les
maréchaux ordinaires peu instruits du
trajet des vaisseaux serrent
outrageusement cette partie avec
une corde quelconque.

Les instrumens propres à cette
opération sont un bistouri droit, des
venettes à droite et à gauche, une gouge,
une feuille de sauge, un éleve-toire, un

trousser, un bouton et des tricotes, ou
ce qui vous convient la tresse adente —
des tressés et effet et qui est beaucoup
plus commode que ~~cette~~ les tricotes.

armés vous l'anneau de la tresse, armés
de nouveau la sole en changeant de —
tresse approprier et suivant le côté ou vous
coupez, mais commencez toujours du la-
pierre ou de la partie la plus déclive
du pied, remonte du côté du talon ou
de la partie la plus élevée afin d'éviter
que le sang ne vous inonde et ne vous
offusque. La sole de chair étant —
adecouvert dans toute la circonférence
de la paroi, donnez l'écoulement quelque
coup de bouton dans chaque talon
et l'effet de la dégrader plus exactement
et que l'écoulement de la chair —
soit vu de la sole de chair —
au centre du pied, ~~ne~~ ne tienne, ni à l'écoulement
la partie à enlever. prenez le bistouri,
tenez le fermement, que le pouce de la
main qui travaille suive et se ménage
toujours un point d'appui sur le bord —
de la paroi, glissez la pointe de l'instru-
ment dans le lieu où le pied est cerné
entre la sole de corne et la sole de chair,
faites le parcours dans tout le pourtour
de la sole en changeant, comme vous
le devez l'instrument de main. La



résistance étant plus forte près des talons
aidés la main du bistouri par quelq
petits coups du manche du bistouri
~~vous frapperiez sur le dos de la lame et~~
c'est ainsi que vous la forcerez à
percer et à traverser les talons; ~~glissez~~
engagé l'élevatoire sous la sole. De
côté du côté de la pince, soulevez alors
cette partie, ordonnez à un aide
d'engager en même temps l'un des mors
de la tricoise ou ^{le mors fixe et poli} de la tenette à dents sous
l'apophyse de la sole soulevée, qu'il agisse en
renversant les bords de celui de cet
instrument dont il se sera servi du côté
des talons et à force de musc qu'il tire et
qu'il enlève la sole obtenue sous-même
d'une part le pied dans un sens contraire
et de l'autre incisif soigneusement
la partie de la sole ou de la fourchette
qui s'opposent encore par quelques
adhésions à la désunion des deux sole.
ayez recours ensuite à la feuille de sauge
ou à la gomme pour égaliser la sole et la
fourchette molles, soulevez tout ce qui pour
être resté des parties dures, vous les
recouvrirez par l'inspersion et vous vous
en assurerez par le tact en passant la surface
du pouce sur toute la partie opérée.
pratiquez ensuite un sifflet, entaillé pour
cet effet le parois supérieure de la profondeur

2^{ème} *Causes des opérations du*
piéd.

de quatre ou cinq lignes environ. L'objet de
ce sifflet est de faciliter l'écoulement du sang
et de tout le liquide qui seroient retenus par
le fer que vous attachez en brochant dans
les vieux trous, différez le tourniquet, mettez
le piéd abas, laissez saigner, relevez le
piéd, remettez le tourniquet, lavez la partie
opérée avec une liqueur spiritueuse —
quelconque et appliquez l'appareil convenable.
cette application doit être raisonnée et —
méthodique, autrement il survient des
inconveniens considérables, remplissez et
garnissez d'abord tous les petits enfonce-
mens de la sole et de la fourchette par le
moyen de petits plumaceaux artistement
faits et imbibés d'essence de terre benténe,
établissez ainsi un niveau parfait. Si la
compression est trop forte dans une partie
elle tombera en mortification, si elle est
trop faible dans une autre il y aura
hémorragie, j'ai vu l'un et l'autre dans
la même tumeur. La plus légère inégalité
donne lieu à ces tumeurs que le
vulgaire nomme du nom de cerises,
elles surviennent dans le lieu où la pression
a été la moins attendue la plus grande
facilité de la régénération en cet endroit
et souvent des artistes qui n'ont ni
attention, ni lumière, se voyent contraints
de reiterer l'opération pour obvier à la
claudication qui la suit, on doit au surplus
comprendre qu'en comprimant trop forte-
ment



on mache et l'on meurtrit toutes les parties.
les plumaceaux parfaitement rangés,
engagés les uns sous le fer et lorsqu'ils
seront parfaitement adossés, placés la
traverse qui doit être de Tôle et non
de bois. Enveloppez le pied de laque
plumaceaux chargés de substance
defensive, ou succollientes, ou anodines,
et fixez ~~les~~ par le moyen
d'une enveloppe et d'une ligature.
saignez le malade à la jugulaire, placez-le
sur une bonne litière et ne lui donnez
aucun aliment solide. De quatre heures
jamais opération n'a été plus
en usage et cependant plus dans le
discredit que celle-ci. pratiquée jusqu'à
présent par des ouvriers qui soulevoient
leur pied en glissant le levatoire entre
et et la paroi, qui dilaceroient les
feuilletés, qui ussoient ce même os-
sament en le dépouillant de la peau de
chair, qui branloient les parties par
des coups, des secousses et des secousses violentes
qui établissent des compressions dont la force
anéantissent l'organisation du parties. Or
elle étoit infiniment redoutable dans
leurs mains et en effet plus dangereuse
que la malade même pour laquelle
elle étoit absolument indispensable.
cependant une multitude d'expériences
(a) plusieurs d'entre eux ont été déssolés sans aucun
mal dans le pied, ils ont été tous droit et en état
travailler au bout de sept jours.

nous ont après que lorsqu'elle étoit faite
avec méthode elle ne laissoit après ~~elle~~ la
consolidation des parties opérées aucun
vestige de douleur & de faiblesse, de
manière que les animaux nous ont
paru être d'un aussi bon service qu'ils
l'étoient avant d'être opérés, il peut
arriver cependant que les causes qui
y déterminent soient telles qu'elles laissent
sur les parties organiques du pied des
impressions sinistres plutôt d'un genre
d'affection qu'à l'opération même.



Operation du Crapaud.

La partie ou les parties affectées
sont celles qui exigent les premiers soins.
parés jusques au vif les portions de la
sole et de la fourchette solides que le
crapaud n'aura pas endommagées, —
enlevés aussi celles qui vous paroissent
detachées et séparées de la sole et de la
fourchette molles; abattre la paroi
jusqu'au niveau de la sole, enlevés de cette
même paroi celle qui recouvre et dérobo
des feuillets de la nature de cet ulcere
cailloté, entaillé au moyen de la
venette cette même paroi dans toute
son épaisseur de haut en bas, en de là
et en de là du mal, séparés le bord
supérieur ou la couronne avec le
bistouri, cette incision doit s'étendre
d'une entailleure à l'autre, asserés avec
cet instrument diviser les feuillets qui
forment le cor quelques adhérences, —
soulevés et renversés ensuite cette partie
du sabot qui dérobo les feuillets offensés
à la faveur d'un elevatoire que vous
engagerés dans l'une des entailleures
entre l'os du pied et la partie à soulever
Les feuillets des quartiers et des talons, sont
ceux qui sont le plus exposés et le plus
souvent endommagés par le pus de
cet ulcere. coupez le poil autour de la

couronne & de paturon, attachés un
peu très légers très délayés, hachés et
séparés conformément aux ampu-
tations que vous auriez faites à la
paroi; mettre sur le crapaud & dans
ses interstices des toupes sèches, appliquées
autour des parties intacts du sabot,
de la couronne & de paturon des
plumaceaux chargés de substance
grasse & anodine.

Renouveler le pansement du
crapaud trois fois par jour & même
l'avantage, si l'ulcère est encore plus
humide; les plumaceaux chargés de
substance grasse peuvent rester 24
heures sur la partie, mais il faut
avoir la précaution de la bien nettoyer
à chaque pansement afin d'éviter
les effets des graisses séchées & rances;
continuer régulièrement ces pansements
jusqu'à ce que l'animal ait été
suffisamment purgé, que les humeurs
aient été détrempées, délayées &
dépurées; dès que les bons effets des
remèdes intérieurs seront marqués
par le rétablissement des excretions
interceptées, par la diminution de la
quantité, de l'aridité, & de la fétidité
de l'humeur que fournit la partie



malade, procéda à l'opération qu'elle exige.

S'il est dans le même sujet plusieurs pieds atteints de crapeaud, ainsi qu'il arrive après souvent, n'en — n'opère qu'un seul, mais commence par le plus malade; continue les — précautions de précautions à celui ou ceux qui restent, à l'effet d'arrêter toujours les progrès du mal sur — sur, progrès qui seroient d'autant plus grands alors, que les humeurs — arrêtées et déviées par l'opération seroient disposées à y affluer. lorsque le pied opéré sera en voie de — guérison et en état de supporter une partie de la masse sans en être — offensée, purgez une ou deux fois et procéda à une seconde — opération en commençant toujours par le pied le plus endormi et ainsi de suite jusqu'à la guérison totale de tous les crapeauds.

Si la partie est grièvement — offensée, si les cartilages latéraux sont lésés et que vous soyez reculé de les amputer, faite l'opération en deux temps, extirpez la plaque et

fourchette molles ainsi que le quartier
le plus gâté, et n'enlevé l'autre
quartier qu'après que le premier
aura acquis un certain degré de
force et de consistance.

Les instruments qui conviennent
ici sont tous ceux propre à
l'opération du j'avant l'urone,
de la dissolution et de l'enlèvement
du corps pyramidal, attendu que
l'on est souvent dans la cruelle
nécessité de pratiquer toutes ces
opérations dans le même instant
et sur le même pied.

L'animal assujéti dans le travail
et le pied fixé par le paturon ainsi
qu'il doit l'être pour la dissolution,
ôté le fer, mettez le tourniquet, placez
le bandeau de or sepmoïdes de manière
que les plottes portent sur les artères
latérales et les compriment.

Enlevé toutes les portions de la pole
et de la fourchette solides que vous
venez d'enlever et qui seront restées
intactes.

Si la pole solide adhère dans
tout son pourtour, ce qui est assez
rare, car elle est le plus souvent



En plus grande partie desuée, macérée
et pourrie, subvies la ainsi qu'il est
prescrit dans l'operation de la dyssenterie,
subvies aussi la portions de la parois
qui vous paroissent caves et allées
même au delà de l'endroit ou le pus
aura porté quelques atteintes.

Le crapeaud etant absolument
adecouvert de toute ce qui s'appelle
partie dure ou ongle; armés vous
d'une feuille de sauge ala me étroite
et très affilée, coupés et subvies entiere-
ment et même au delà la substance
de cet ulcere formidable; subvies aussi
avec ce même instrument les feuilles
macérées et pourries que vous aurez
depoüllées de la parois, ratissés et
cauterisés la portion de l'os dans la
quelle ils estoient implantés; si les
rains du crapeaud attaquent
l'aponeurose du profond de couvris atte-
partie et cauterisés avec les vaisseaux
variqueux ainsi que les taches noires
et pourprées que vous y rencontrerez.

Le tiffus gras et spongieux qui
compose le derriere de talon merite
un examen severe de la part
de l'artiste. S'il est jaunâtre, flasque,

bourbouflé, si le suc gras ne s'échappe —
des cellules dans lesquelles il est contenu —
enlevés le entièrement (voyez l'extirpation
du corps pyramidal) quand-même vous
n'apercevez dans la substance aucun
vestige des fibres qui composent les
vaisseaux du crâne. Souvent l'omission
de cette extirpation lorsqu'elle étoit urgente
et nécessaire a été la cause d'une
nouvelle production de la maladie
dont il s'agit.

Toutes ces sections, ces amputations,
ces extirpations et ces cauterisations —
étant faites, procédés à l'enlèvement du
cartilage qui vous paroît et qui
sera véritablement offensé, cette
opération étant absolument celle du
jovard suonné (voyez en le manant)
vous relâchez les ligaments et la dernière
et uniquement après avoir attaché le
fer dans la crainte d'exposer le
ligament capsulaire de l'articulation
de la couronne avec l'os du pied
aux extensions et aux ruptures auxquelles
il est sujet, lorsque l'article éprouve
des efforts même bien moins violents
que ceux qu'il feroit nécessaire d'éprouver,
si vous eussiez débuté par le découvrir
et le dépouiller du corps cartilagineux qui



est la seule partie qui le soutient et le
soutient. Si le quartier opéré mérite
pareille opération, ne la pratiquez pas
dans l'instant ainsi que nous l'avons
déjà dit, mais attendez que le quartier
souligné soit régénéré et fortifié.

L'opération ou les opérations faites,
ôtés le tourniquet, laissez le membre
laissez saigner en raison des opérations
pratiquées, reprenés la partie malade
fixés la par la partie moyenne des
canon à l'effet de placer l'appareil
avec plus d'aisance; mettez sous le
tourniquet au dessus des os splancoïdes,
netoyés et lavés avec de l'eau de vie
ou autre spiritueux quelconque, les
parties opérées du sang grumeux et caillé
qui les recouvre, posez la partie
concave du pied avec des plumasseaux
imbibés d'essence de terribentine,
mettez le plus grand soin dans leur
arrangement, ainsi que dans celui
des ~~cataplasmes~~ etouppades, plus le pied
est affaibli par des sections et des
amputations, plus il importe de le
conforter par un pansement méthodique
éviter absolument toutes irrégularités
et toutes fausses compressions, placez
les sutures et sugez la traversée,

remplir les becs faits à la paroi,
garnir l'enfoncement qui ~~est~~ est une
suite de l'enfoncement du cartilage,
conformer vous à cet égard à ce qui
est dit dans l'opération du javart
Enrouer assujettir les plumaceaux et
les étoupades placées sur les parties
latérales du pied avec une bande
large de deux travers de doigt, de
trois aulnes de longueur et roulée
à deux chefs, comprimer encore dans
les circulaires que vous formerez avec
cette bande de fer, les échilles et la
traverse, couvrir et envelopper le pied,
la couronne, le paturon et le boulet
D'un cataplasme de fleur de saignée
le malade à la jugulaire, donner lui
un lavement emollient, un opiat
calmant et mettre le dans sa place
sur une bonne litière. /



Extirpation du corps
pyramidal

ou de cette partie du pied qui dans le
cheval compose ce que l'on nomme
la fourchette molle ou de chair.

Le corps dont il s'agit est un
espèce de coussinet gras, —
folliculaire très compacte, doué d'une
sensibilité extrême et par conséquent
susceptible d'irritation et d'inflammation
par la proximité seule des parties —
adjacentes avec lesquelles il ne communique
néanmoins que par l'intermède des —
vaisseaux, mais. D'où naissent des abcès —
dont la formation y suscite des perceptions
insupportables, la fièvre et tous les maux —
qui en résultent. il est plus exposé que
la sole molle ainsi que la substance —
feutrée à ces tumeurs phlegmoneuses,
et érysipélateuses, malignes dont la
source est dans l'arête d'une tumeur
souvent acroïque pour opérer la
cure de la fourchette solide dans un
espace de temps aussi court qu'inopiné;
c'est au surplus dans la substance de
ce corps pyramidal que les vaisseaux
ou plutôt les vaisseaux dont l'ensemble
constituent ce que l'on nomme —
poireaux, crapeaud etc. prennent le plus

fréquemment: ^{naissance} il est aussi très exposé aux
atteintes funestes des coups de rive & des
chocs ainsi qu'à des lésions, des contusions
et des divulsions qui occasionent non seulement
la suppuration de cette partie, mais encore
celle des cartilages latéraux, par conséquent
~~et~~ des javarts incurvés très malins.

ce mal n'oblige pas néanmoins
toujours l'artiste à l'entèvement entier du
corps pyramidal, il ne doit en effet l'extirper
qu'autant que la circonspection le demande
et l'exige: on prévient souvent la
formation des abscesses qui paroissent après
des contusions et des déchirements énormes
ou qui sont une suite de l'irritation
faite par les playes voisines et qui la
suppuration n'est pas et ne peut s'établir
telle que celles qui résultent de l'opération
du javart incurvé, de la piqûre, de la
brûlure et de la pecton d'une partie
de l'aponévrose du profond, de la cautérisa-
-tion de l'os du pied, de celle de l'os
articulaire, de la dilaceration des
ligaments de l'Épiphysse de la
trottoir &c. en faisant prendre des
pédicures emolles, anodins, et tenant
autour de la partie souffrante des
cataplasmes de même nature, en
saignant, en tempérant la masse des
humeurs &c. il est vrai que tous



ces moyens ne sont pas toujours
efficaces, mais ils n'arrêtent pas moins
les effets tumultueux des étranglements.
en relâchant les fibres, en modérant le
dépense des artères et en calmant les
vibrations des fibres nerveuses, en sorte
que la rupture des vaisseaux et des
cellules adipeuses étant moins considérable
la collection de la matière sera bornée
dans un petit espace. de manière qu'elle
n'exigera pour son issue qu'un simple
coup de bistouri donné dans la partie
intérieure et inférieure du paturon.
Le lieu le plus ordinaire de cette
collection en pareil cas est dans
ce qu'on appelle le sac de cellules
graisseuses que l'on observe de chaque
côté de l'intérieur du talon, entre
la base du corps pyramidal et la
concavité que présente la face interne
des cartilages latéraux. à l'égard
de l'espèce de parricide auquel cette
partie du pied est sujette, des fois et
contenues vous de la scarifier très profondé-
ment dans plusieurs endroits de son
étendue afin d'opérer dans le paturon
dans lequel vous laisserez séjourner
le pied, une ample évacuation de
sang. ces scarifications doivent être

dirigées suivant la direction de la —
bifurcation. les parcaus et les crapcaus
n'exigent que l'amputation de la partie
qui en est pénétrée.

mais vous devez avoir recours sans
hésiter et sans délai à l'extirpation totale
de cette partie toutes les fois qu'il est —
indispensable de mettre le derrière du
pied à découvert, qu'il importe de —
fournir une issue au pus formé dans les
gaines des tendons ou entre les tendons —
même des muscles flexisseurs du pied, —
qu'il est urgent de découvrir le trajet
d'un clou de rive, d'un apicot dont
la pointe aura lésé les parties délicates
et enfoncées que cette même partie —
dépense et compacte de roquentin. mais —
cette opération en exige une autre qui
doit la précéder immédiatement, c'est —
la désobésité, voyez en le manuel et —
n'omettez aucune des précautions —
prescrites pour la préparation du malade
et surtout de la partie par l'usage des —
remèdes qui relâchent, qui détendent
et qui calment.

La sole et la fourchette solides —
enlevées, abattus l'extrémité de la paroi,
composant les talons supérieurs aplan



jusqu'à quelque distance de l'extrémité
du cartilage, armés vous l'un bisouri
droit dans la pointe soit très afilee, fendez
les tegumens suivant une direction
verticale a compter de la partie
moyenne et postérieure du pateron
jusqu'à la bifurcation de la fourchette
molle, l'épave de rasé qui lapeau
forme en cet endroit par l'union
des talons est précisément le lieu
qui doit être incisé. Si vous manquez
le pateur qui recouvre cette partie
la cure sera plus prompte et la
cicatrise moins difforme; puis-
vous l'un après l'autre, soit avec les
doigts, soit avec les pinces anatomiques
chaque des deux bords de peau que vous
venez d'inciser, disséqués les jusqu'à ce
que la partie postérieure du bas du
pateron soit adécouvert. faites tenir
par un aide au moyen d'une éponge
le premier de ces bords que vous
aurez disséqués afin de disséquer le second
plus commodément. La base du corps
pivante étant adécouvert procédez
à son subèvement, incisé avec le
bistouri droit l'un des talons entre le
cartilage et le corps a sublever, —

prolonger cette incision jusqu'à l'extre-
-mité de la pyramide en suivant toute
l'étendue de l'interstice de la fourchette
molle avec la pince de chair; mais —
prendre garde que la pointe de l'instru-
-ment ne pénètre et n'atteigne ni le
cartilage, ni l'os du pied, ni l'aponévrose
du perforant; changer le bistouri de
main et pratiquer les mêmes incisions
du côté opposé. armer vous ensuite
d'un scalpel à deux tranchants, disséquer
la partie supérieure et postérieure du
corps pyramidal, le tissu cellulaire —
au moyen duquel il adhère aux
cartilages latéraux, ainsi qu'aux gaines
du tendon du muscle supinateur et —
profond et ainsi faire pour que les
interstices soient très aisés à pénétrer
avec le scalpel, mais il n'en est pas
de même depuis la partie moyenne
à l'extrémité de ce corps, le tissu —
fibreux qui unit cette partie à l'a-
ponévrose du profond est aussi serré,
et de manière qu'il faut
avoir beaucoup d'attention pour ne
pas intéresser cette partie aponévrotique;
quoiqu'il en soit, le corps dont il s'agit
détaché des portions qu'il recouvre, il —



adhère l'un par l'autre à la ple
malle dont il est une continuité,
adhère de l'un à l'autre en incisant cette
partie de toute part.

Examinez ensuite si le mal est
entièrement adhérent. Si le pus a
fusé dans les gaines des tendons, fendez
les de bas en haut en suivant la direction
de l'apophyse, mais évitez d'offenser
les parties qu'elles entourent en ne
pratiquant l'incision qu'avec la pointe
d'une sonde cannelée. —
Si vous êtes nécessaire de découvrir
une portion de l'os articulaire, entamez
l'aponévrose du muscle profond qui
la recouvre, incisez cette aponévrose
suivant la direction de ses fibres, —
mais n'en portez de ces mêmes fibres
que ce qui faut pour découvrir la
partie endommagée de l'os. cauterisez
cette partie au moyen du cautère
à antimoine (voyez l'op. de la cautérisation).

L'opération faite, laissez saigner
les parties opérées, mettez sur les parties
tendineuses, aponévrotiques, ligam-
enteuses, cartilagineuses et osseuses —
adhérentes et offencées des plumaceaux

imbibé Noppe. de terre bentine.
poudré en suite a l'application du
reste de l'appareil en vous conformant
a tout ce qui est prescrit a cet
Egard dans l'operation de la desolure.



1871
Jan 1
Feb 1
Mar 1
Apr 1
May 1
Jun 1
Jul 1
Aug 1
Sep 1
Oct 1
Nov 1
Dec 1

Amputation de la queue.

Des maladies, l'usage auquel on destine
L'animal et le plus souvent le caprice, sont
les motifs qui engagent à cette opération
qui consiste ou dans une amputation simple
de la queue, ou dans des incisions faites
aux muscles fléchisseurs de cette Partie que
la nature sembleroit donner au cheval pour
lui servir non seulement d'ornement, mais encore
de Défense contre les insultes des mouches &c.
les maladies qui y obligent sont la gale, des
Dartres, des tumeurs, des abcès, des D.
fistules d'une certaine espèce &c. cette partie
en quelquefois atteinte. les chevaux de remonte
et généralement ceux qu'on attache à la queue
les uns des autres sont très sujets à avoir
la queue gorgée, tumescée & le plus souvent
spéculée par la compression des courroies qui
la tiennent collée trop longtemps & trop
fortement. L'opération en est même quelquefois
impossible Cas que le moindre délai a été suivi
de la perte des animaux (a) le Spinalet

(a) Pour éviter de s'appeler pour porter secours à un cheval
qui avoit eu la queue fortement serrée par la longe ou
le col d'un autre cheval qu'on avoit attaché à cette partie



1
s'étant quinqué de proche en proche et une
soit parvenue dans l'os sacrum. Il n'y a plus
de moyen pour y remédier. Le nombre de
Chevaux qui nous avont vu périr de
cette manière est Immense, les uns avont
pour cause l'application trop forte du brule-pain
Le frottement de la partie fraîchement courée
Contre des Corindons, des incisions et des lésions
gâties sans Jugement et sans art, ceux-là
luxations, des fractures &c.

On a remarqué depuis longtemps que
Le Service des Chevaux que l'on destinoit à
la Course, à la charre, à l'attelage, à la charrue
&c. étoit plus commun lorsque ils étoient
courts qu'ils étoient lorsque ils avoient tous leurs
brins et cette époque a été sans doute celle
où le Sacrifice de cette partie fut fait aux

Il y avoit deux heures qu'on avoit ôté cette ligature, la
croupe étoit déjà météorisée, l'anus étoit et paroissoit
gorgé, la queue étoit froide et molle. nous l'amputâmes
en différentes sections jusqu'à l'os Sacrum, nulle effusion
de sang. peu d'instants après, l'animal qui jouissoit de la santé la
plus parfaite auparavant et qui étoit jusqu'alors vigoureux et l'art
main paralysé, tomba dans des convulsions terribles et mourut au bout
de 6 heures (c'est à dire 8 heures après que la ligature avoit été ôtée).
L'ouverture fit montre d'une gangrène générale du bas ventre et de la
Nous avons vu même au même arriver à un cheval pour avoir retiré et
fixé les brins à la partie supérieure de la queue au moyen d'un ruban
de fil qu'on avoit serré avec un couteau. /

Chevaux dont la croupe étoit longue, pointue,
trauchante, coupée et dont le corps précédoit par
un excès de longueur. Ces tranchements ayant été
pratiqués à ceux en qui ces défauts existoient
on observa effectivement qu'ils étoient moins sensibles,
mais dans le moment actuel le caprice semble
l'étendre indifféremment sur tous les chevaux, &c.
N'y a guère effectivement que ceux de troupe &c.
paraître et de manger qui en soient exempts.

À l'égard de l'opération que les Anglois
pratiquent à l'effet de faire porter la queue
en troupe, nous croyons qu'elle leur a été suggérée
par les Chevaux véritablement arabes & leurs
champions qui la portent naturellement ainsi.

Et nous appellerons la première amputation simple
et celle des Anglois amputation compliquée.

L'une et l'autre de ces opérations ne sont
ordinairement pas dangereuses pour elles mêmes.
Les seules fautes dont elles sont quelquefois
accompagnées sont presque toujours l'effet de
la négligence ou de l'ignorance de l'opérateur :

Il en néanmoins est sujet véritablement
cachectiques en qui l'amputation compliquée
peut donner lieu au développement d'une
infinité de maux qui auroient vraisemblablement
été évités et évités encore longtemps.



Dans le torrent Sans cette opération (a)
en paraît (as l'on suppose) que si les humeurs
développées se portent sur la partie opérée
Il s'y manifesterait des accidents plus ou moins
Terribles (voyez le chap. des ulcères).

L'amputation Simple de la queue exige peu
de précaution, on peut la pratiquer en tout temps
Dans toute sorte de Saison et dans tous les
Jours de la Journée; mais comme Il en est des
Chevaux Coliques qui se tourmentent et s'agitent
Vivement pour se soustraire à l'insupportable
Sueur du bruto queue, Il importe de la
Faire dans les fortes chaleurs et dans les
grands froids, mais principalement lorsque
L'animal a l'ennemi pressé.

A l'égard de l'amputation compliquée Il y a plus de
précautions à prendre, Il en question de plusieurs
Plays (craintes profondes, de la Section de
plusieurs muscles, de plusieurs artères, de plusieurs nerfs

(a) nous avons eu une jeune qui est morte le 11^{me} jour de l'opération
après 4 jours de maladie. Il n'y avait rien de particulier à la queue qui fut
examinée avec tous les soins possibles, mais la poitrine et le bas ventre étoient
dans le plus mauvais état. vomique, s'écoula dans le lobe droit, en abondance
d'un sang noir et dimua dans le thorax et dans le bas ventre, foye comme celui
d'un sang clair et muqueux abouilli par le sang, sphacèle dans les gros
intestins, inflammation très marquée dans les petits. Cette maladie nous a
paru être l'effet d'une gourme fixée sur les poimons et les autres parties
des viscères être le produit de l'inflammation subéquente.

Nous avons vu aussi naître après cette opération des humeurs de divers
sortes, la morve, des angines, des humeurs rhumatismales, la fourberie &c.
mais la plupart de ces maux ont été à l'efficacité des remèdes.

Deligamus & & & ou mû une fièvre &
râleurante pour les chevaux les plus sains
et les mieux conditionnés ne sont pas exemptés. —
Les premières douze ou dix heures. C'est
l'opération se fait exige d'une 1^{re} que la saison
soit favorable et qu'il ne fasse ni trop chaud
ni trop froid. 2^o que l'animal ait été
quelques jours auparavant à la diète et que
les humeurs aient été détrempées par
des boissons et des lavemens emollients. 3^o qu'il
soit à jeun et qu'il n'ait pas eu à souper
la veille. 4^o qu'il ait été préalablement
purgé pour peu qu'on soupçonne des
humeurs dans le sang. 5^o qu'il soit sain
et nullement affecté de vices intérieurs tels
que des eaux d'une certaine espèce, de la
galle, du farin & & à moins que ces
maladies ne soient benignes et ne tendent à
guérir. Il n'en est pas de même à l'égard
des maux vraiment locaux : Nous pratiquons
cette opération très souvent dans le moignon
Jacovrinien après l'extirpation de la tumeur,
d'un ou de plusieurs quartiers, de la castration
& & à l'effet de profiter du temps où l'on
qu'on est obligé d'accorder à l'animal pour
la cure de ces maux ; mais l'opération.



dont il s'agit n'est pratiquée en pareil
Cas que lorsque les premiers accideus et
les premières Douleurs sont extrêmement
graves.

L'empulatoire. Rempli & Pratique
de plusieurs manieres ou sur le billot avec
un maillet et un coupeet; ou avec le boudoir
et une mainue, ou simplement avec un fort
bistouri, ou très Commode & très
promptement avec les Ciseaux destinés
à cet effet.

La lame des uns et des autres de
ces instruments, doit être bien tranchante,
mais non trop asidée afin qu'elle résiste
lors de l'ouverture dans les piéces osseuses.

La lame du boudoir sera suffisamment
large et proportionnée au volume de la quinié
qu'elle doit recevoir, elle sera aussi dépourvue
de Cixnes, elle retiendrait la plus grande
partie du coup, elle obligerait à des
redouces toujours très dangereuses pour
l'opérateur et très douloureuses pour
l'animal. Durant cet instrument est le moins
commode de tous, on ne doit le mettre en
usage qu'autant qu'il en est impossible de se

aire antérieure. à l'égard du bistouri, il
ne peut qu'être servie pour les animaux
d'une petite espèce, les poulains et les chevaux,
dont la queue est mince et peu fournie.

Quant à l'entremise, dont on a fait
choix, il faut tenir les crins à l'écart,
très exactement depuis l'origine de la queue
jusqu'au lieu où on se propose de faire
l'amputation. Ce lieu est où doit être pour
les juments fixée dans l'endroit répondant au
dessous de la vulve; la longueur de la queue
des bêtes d'attelage et de chaise, sera au
degré requis si elle égale la distance qui
s'observe d'une apophyse orbitaire à l'autre.
C'est-à-dire, au tiers de la longueur
médiante de la tête de l'animal. et la
coudre, un peu moins courte pour les chevaux
de selle et beaucoup plus courte pour ceux
qui ont des queues de rat ou garnies de
crins.

On se sert en outre avec des ciseaux des instruments
à l'usage de deux ou trois Travers de Poigt
ou de ceux que vous avez trouvés,
C'est-à-dire, précisément dans l'endroit où
l'opération doit être pratiquée, mais que
vous n'entreprenez qu'après que.



1^o l'animal sera arrêté 1^o par un torse-ne.
2^o par une plate longe qui vous fixera à
l'encolure, et qui passera dans un des
travertins des extrémités postérieures à l'effet
de tenir le pied en avant et le ligament fortifier.

Tout les chocs ainsi disposés, faites
tenir l'extrémité de la queue par un aide,
sautez-la, reposez horizontalement sur le billot,
c'est ordinairement la première bueche que
l'on trouve à sa portée. Si elle est trop
courte sautez-la, soutenez par un aide,
appliquez verticalement sur le lieu, orné
le tranchant du couperet; frappez avec
certement avec le maillet sur le dos d e.

3^o Instrument pour opérer la séparation de la queue.

Si vous faites usage du bouteret tenu
c'est l'instrument de la main gauche par
la queue, près de la lame, placez-en le
tranchant dessous la queue, qui sera tenue
par un aide comme dans la méthode
précédente, soulevez le bouteret afin de
faire Decuire. Et la queue un ligament
de Cercle, frappez un coup sec au moyen
d'une manne ou d'un morceau de bois
quelconque d'une force et d'une longueur d

Suffisamment donc, votre main droite sera
armée, Dirigez le corps précisément sur
la partie de la quille soutenuë et soutenue
par la lame de l'Instrument.

Si vous vous Servez du bistouri,
Tenue le bistouri avec la main gauche
le plus près qu'il vous sera possible du
lieu où vous devez Inciser, Celui est entre
les pieces articules, avec le reconnoître en
saisant agit les pieces osseuses, l'endroit mobile
Sera l'endroit de l'incision, armez-vous du
Bistouri, Tenez-le à pleine main, facilitez
le passage de la lame en contourner la
main qui Tient la quille de manière à
couvrir la partie supérieure de l'articulation
Dans laquelle l'Instrument doit passer.

L'amputation avec les Ciseaux est plus
nette, plus prompte et moins douloureuse,
Tenez-les de manière que la branche de
repondant à la lame repose par sa concavité
Sur le pli du bras avec l'avant bras
gauche, que l'extrémité de cette branche
ou la poignée soit Dans la main de la
côté et que la poignée de l'autre branche
soit en appui dans la main droite; placez
vous du côté du moignon et de manière



que votre bras repose à la fenestra
du charat, faites tenir et tirer la queue
par un aide, placez le mors noir tranchant
de la Cizaille sous la partie cernée,
agitez de la main droite en appuyant
fortement sur la Brauche, retirez du bras
gauche de manière à ne point céder à la
force employée pour opérer l'amputation désirée;
elle se fait seule & souvent d'une Jussure
et sans que l'animal s'en aperçoive.

L'amputation faite, quelque de la
Méthode que vous ayez suivie, laissez
saigner un instant et arrêtez le Sang.
Le feu, les astringens et la ligature sont
des moyens égaux pour; le feu est néanmoins
celui que vous devez préférer comme le plus
certain et le plus sûr (voyez la cautérisation).

Employez les astringens en poudre, appliquez-
les immédiatement sur l'embouchure de la
Plaie (voyez le chapitre de la saignée d'une
petite poche de toile qui recouvre l'extrémité
coupée et que vous fixerez au corps de la
queue au moyen de quelques liens.

Religiez la ligature au moyen d'un
petit bandage unissant fait d'un ruban

De fil étroit, placés-le & recircons. sur
le bord de la plaie, Serrer jusqu'à ce
que le sang ne coule plus, fixés et arrêtés
les extrémités du bandage par le moyen d'un
noeud à rosette ou, ce qui vaut encore mieux
par quelques points de suture

Otez la poudre au bout de 24 heures,
mais ne laissez la ligature que 8 ou 10 heures
au plus.

Cette amputation se pratique encore sur
les bœufs, les chiens et les chats: rien n'est
plus facile que l'exécution de cette opération
dans ces animaux. Faites reposer la queue sur
une surface plane, appliquez le tranchant
d'une pèle de fer chauffée et tenez-le
s'ajourner jusqu'à ce que la séparation
soit parfaite. Les bergers se contentent de
tourner la queue de leurs bœufs & la pelle
même, de la rompre et de l'arracher. nous
préférerons la méthode que nous indiquons.

Amputation compliquée

Il en est question de faire porter
la queue de l'animal en brousse. cette
opération se pratique en deux temps.
Dans le premier on ne doit s'occuper



Les Instrumens propres à l'opération ainsi
que les pièces composant l'appareil doivent
être (Brisées. munies de - vous d'un bistouri
courbe, de ciseaux courbes sur plat, de pinces
anatomiques, d'une érigne; de plusieurs petits
bandages à quatre chefs. C'est-à-dire, de
bandelettes de toile ferme de deux pouces de
largeur sur 12 à 15 pouces de longueur (sur les
bras leurs extrémités, de plusieurs petits
plumasseaux, d'éponge et d'esprit de
vin.

Faites tenir la queue par un aide,
saisissez le ventre au-dessus d'une ligne
horizontale sculante (a) Si vous opérez.
la queue étant renversée et couchée sur la
croupe, votre travail sera plus à l'aise
et plus facile, mais les vaineaux, alors
seront coupés plus près de leur base qu'ils
ne l'auraient été si les parties inférieures
de la queue n'avaient été aussi fortement
distendues et le résultat en a été souvent
d'accidens très graves, la suppuration
suppuratoire de la queue et de la croupe,
le pyré et la mort. Nous avons vu



(a) Quelque soit la situation du malade, nous supposons
toujours qu'il est debout pour les directions à donner soit
aux parties, soit aux incisions.

1
cuni maître) par cette méthode des
fistules résultant seulement des embouchures
intérieures et récurrentes dans les queues latérales
à l'inspiration très profondément sans la
moindre effusion de sang: ces fistules ont
par conséquent cédé aux injections anti-syphili-
tiques même les plus actives.

Armer ~ vous d'un bistouri Courbe,
tenir le poignet milieu de la lame entre
le pouce et l'indicateur le manche enfoncé
dans l'interieur de la main et enjeter par
l'extrémité des autres doigts: les deux
tenant la lame doivent être réunis d'une
manière à en former l'entrée dans les chairs.
enfoncer l'instrument entre les deux os
sacro-coccygiens les plus inférieurs, le dos
de la lame tourné du côté du ligament
sacro-coccygien, prolonger l'incision
de dedans en dehors à l'effet de couper
transversalement et entièrement les deux
muscles psoas de ce côté. prendre
garde que la pointe du bistouri ne
pénètre dans le corps des os de la queue
et surtout entre les pièces vertébrales, elle
doit suivre seulement les enfoncements
osseux dans lesquels les muscles sont logés.

pratiquer la même opération sur les deux
muscles sacrococcygiens du côté opposé, les
deux premières incisions qui ne s'écartent
que par le ligament sacrococcygum et la peau
qui le recouvre, doivent être bien parallèles
et absolument sur la même ligne, et de
même de l'autre. répéter de parallèles
incisions au dessous des précédentes toujours
à la même distance et à la même
distance les unes des autres. Le nombre de
ces incisions est fixé par la longueur
du tronc qui doit être la même à la queue
et qui est ordinairement plus longue ici
que lorsqu'on l'ampute. Simplement, mais
ce nombre ne passe jamais celui de cinq. les
quatre sacrococcygiens inférieurs dans un
coupés dans quatre ou cinq endroits différents
Il importe encore d'amputer et d'extraire
une portion de chaque muscle à l'effet de
s'opposer à leur fuxta-position et à leur
réunion et c'est pourquoi dans cette
extraction qui consiste le mérite de
l'opération. renverser la queue sur
la croupe, inciser la partie moyenne



De Chacun des bords antérieurs des
playes précédentes (a) jusqu'à un
travers d'ongle environ d'un bord.
D'une manière que les deux incisions réunies
de chaque playe des tegumens présente
la forme d'un T, (b) écarter à la saignée
de cette incision les lambeaux musculaires
amputés-les avec les ciseaux courbes sur
plat à un tiers, ou à la moitié d'une
longueur. Examiner chaque playe en
particulier, détruire les linéaments
chaus qui pourroient avoir échappé
au bistouri afin de prévenir les étranglements
et les anévrysmes qui pourroient en résulter.

Le Docteur ou praticien cette seconde
incision immédiatement après la section
transversale des muscles à ces bords.
Chaque de ces petites opérations est
pratiquée dans le même temps, ce qui
est indifférent pour le résultat, pourvu
qu'il y ait de la justesse dans les incisions
et de la parité dans les extractions (c),

(a) ou ce qui revient au même la ligne Supérieure
Si l'on se place la guêpe dans la situation
Naturelle, c'est à dire pendant le long des fesses

Mais en pratiquant ainsi que nous
l'avons indiqué. Il est plus facile d'observer
cette régularité et cette sûreté ce
qui n'est pas indifférent puisque le
pore doit ou recoller à la queue cadavérique.
Il reste encore à s'opposer à l'écoulement
d'urine formée par la peau et le
liquide sacrocoecygin qui sépare les
plages d'un côté avec les plages du côté
opposé. Incisés du même coup de bistouri
les deux parties coupées au sac intestinal
dans les endroits répondant aux deux
premières incisions, mais n'incisés que
la peau dans les endroits répondant aux
autres plages.

L'aine saignée au fer rouge, lavée
le tout avec de l'eau froide vinaigrée,
remplissez les deux plages parallèles situées
le plus près de l'autre et suturez-les
graduellement et suturées d'extrémité en extrémité;
Rabotez un miroir comme ce miroir
le tout par le moyen d'un bandage
devant les deux. (Mettez les deux bouts
et arrêtez-les par la partie extérieure et
de la queue) d'une manière à être



facilement ramené ou relâché suivant
les cas et les circonstances. pratiqués
le même traitement sur les deux paires de
trois paires de précédentes et ainsi de suite
jusqu'aux deux dernières.

Saignés à la jugulaire, mettez
l'animal à l'écurie, faites des lotions
toutes les demi-heures pendant les
premières 24 heures avec de l'eau
acidulée sur la croupe et les parties
opérées. Invoquez souvent si des parties
postérieures et en dedans des opérations
jouissent de l'air et si les bandages ne
sont ni trop ni trop peu serrés.

Laissez tomber les bandages d'eux
mêmes, mais avec la précaution d'en
dénouer les chefs le soir, c'est à dire,
dès que l'hémorragie est arrêtée.

Surpauvres le lendemain la queue à
des poulx, mettez d'abord un poids
léger et augmentés-le par gradation de
jour en jour jusqu'à ce qu'il soutienne
la queue dans une situation verticale.
Même qui la renversera pour ainsi dire,

Sur les reins par le moyen du panage
de la corde, qui la s'empêche dans une poulie
n'éprouvant au garrot de l'animal, mais
(cette méthode est fautive), outre les abcès
qui se forment sur la queue il en résulte
d'ailleurs une espèce d'infirmité
dans les Murs sacrococcygiens supérieurs
par la traction (constante) qu'ils ont
éprouvée dans cette situation forcée de
la queue ce qui annule le plus souvent
les effets de l'opération.

A mesure que les plaies se cicatrisent
naturellement les douleurs avec des frémissements
résolutives et irritatives. lorsqu'elles seront
parfaitement cicatrisées et consolidées,
amputés la queue à deux travers de
doigt de la dernière incision restant
conformant à ce qui a été prescrit et
devant à cet égard

Ces plaies ne sont pas toujours curées
et ne se cicatrisent pas toujours
aussi facilement. Si elles ont été
maltraitées dans l'opération, si les
ligaments et les cartilages de l'articulation



ont été interrompus, si la Sinovie s'épanche.
&c. il en résulte une multitude d'accidents.
Des fistules, des clapiers, des indurations, des
tumeurs &c. pour la cure de quelques
il importe de consulter l'article des chèvres.

il arrive quelquefois que le cheval ne peut
tenir la queue malgré l'excision exacte de
tout ce qui n'est d'être prescrit, ce qui est
même assez ordinaire aux chevaux dont
la queue est placée trop bas qui ont la
croupe avalée &c. on doit s'en amuser
sans d'amputer la queue en faisant exercer
l'animal, alors il n'est d'autre parti que de
pratiquer sur les muscles sacrococcygiens
obliques ce que vous avez fait au
sacrococcygius inférieur.

A l'égard des Chevaux mords et en
la queue est chargée de chair Il y a
une véritable impotie à vouloir d'entendre
sur eux Cette opération par la raison
que l'action des muscles étant purement
passive la destruction des antagonistes
N'opérera rien sur les moteurs du mouvement
et ils ne sont pas très irritables et ils

Esprits n'y abondent avec rapidité
et avec force.



